



T-004 - ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA INCIDENTAL: DIFERENCIAS SOCIODEMOGRÁFICAS, PRONÓSTICAS Y DE SUPERVIVENCIA CON LA ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA ASOCIADA A NEOPLASIA Y ETV NO TUMORAL

L. Fernández Bermejo¹, C. Gutiérrez Ortega², C. Monfort Vinuesa¹, C. González Hernández³, J. Álvarez Granda³, J. Rodríguez Hernández⁴ y J. Jareño Esteban⁵


¹Medicina Interna, ²Dirección Médica. Hospital de la Fuenfría. Cercedilla (Madrid). ³Medicina Preventiva, ⁴Medicina Interna, ⁵Neumología. Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Madrid.

Resumen

Objetivos: Estudiar la prevalencia de ETV incidental en una población de pacientes con ETV en un hospital general. Analizar las características sociodemográficas y comparar la supervivencia respecto a ETV asociada a neoplasia y ETV no tumoral.

Material y métodos: Estudio transversal y otro estudio longitudinal retrospectivo de supervivencia en pacientes diagnosticados de ETV en el Hospital Central de la Defensa durante el período 01/01/2009 15/03/2018 mediante angioTAC según Consenso Nacional de 2013.

Resultados: Fueron incluidos 368 pacientes con ETV, de los cuales 108 (29,3%) tenían cáncer. Se incluyeron además 21 pacientes con ETV incidental (un 5,4% del global). En el grupo incidental el tumor respiratorio fue la neoplasia más frecuente, seguido del digestivo, hematológico y urológico. Más del 80% de los pacientes del grupo incidental eran varones, frente al 55,6 y 41,5% del grupo ETV-cáncer y ETV no tumoral, respectivamente ($p < 0,001$). El 33,3% del grupo incidental era fumador y casi la mitad de los pacientes (un 44,4%) exfumadores ($p < 0,001$). El antecedente de cirugía reciente se presentó en el 19% de pacientes del grupo incidental, siendo más frecuente que en los otros grupos ($p < 0,001$). La edad media del grupo fue de 71 años. La mediana de supervivencia en el grupo incidental fue de 2,3 años (IC95%: 0,65-4) ($p < 0,001$). En el grupo ETV asociado a neoplasia la mediana de supervivencia es de 3,4 años (IC95%: 0-7,7). En cambio, en el grupo no tumoral la mediana encontrada es de 8,98 años (IC95%: 6,8-11,1).



Discusión: La ETV incidental es una entidad infrecuente y poco conocida diagnosticada como resultado de una exploración rutinaria con AngioTAC. En pacientes con cáncer es frecuente el diagnóstico de ETV incidental. Hay pocos estudios comparativos con ETV idiopática y ETV asociada a neoplasia¹.

Conclusiones: En nuestra experiencia la ETV incidental se presentó en el 5,3% de los casos, todos con cáncer, siendo el tumor respiratorio el tipo histológico más frecuente.

Los pacientes con ETV incidental presentan menor supervivencia con respecto a ETV asociada a neoplasia y ETV no tumoral.

Bibliografía

1. Khorana A, O'Connell, Agnelli G, Liebman HA, Lee AY. Incidental venous thromboembolism in oncology patients. J Thromb Haemost. 2012;10:2602-4.