



# Revista Clínica Española

<https://www.revclinesp.es>



## HIV-029 - MORBIMORTALIDAD EN PACIENTES VIH DEL BAIX EMPORDÀ (GERONA)

A. Mera Fidalgo<sup>1</sup>, J. Inoriza Belzunce<sup>2</sup>, A. Masabeu Urrutia<sup>1</sup>, A. Alberich Conesa<sup>1</sup>, M. Hortos Alsina<sup>1</sup>, A. Martín-Urda Diaz-Canseco<sup>1</sup> y R. Toda Savall<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Medicina Interna, <sup>2</sup>Unidad de Recerca. Hospital de Palamós. Palamós (Girona).


### Resumen

**Objetivos:** Objetivo principal: definir las causas de morbilidad más frecuentes. Secundarios: describir la relación de comorbilidades con factores de riesgo cardiovascular, hábitos tóxicos, control virológico y tratamiento. Se incluyeron mayores de 18 años en seguimiento.


**Material y métodos:** Estudio observacional descriptivo retrospectivo de casos, mediante SPSS 25, estudiando la distribución de frecuencias de variables y su asociación, de 2014 a 2018, a partir de datos recogidos en la historia.


**Resultados:** 216 pacientes. Edad media 50,14 años, con un tiempo medio de seguimiento 12,75 años. En la distribución de sexos, 31,5% mujeres frente 68,5% hombres. Prevalencia de HTA 24,1%, dislipemia 21,8%, diabetes 6,4%, tabaquismo 59,5% y 35,2% coinfección. Carga viral detectable 10,6% e inmunosupresión severa 14,4%. 6 infecciones asociadas al VIH y 16 infecciones no VIH graves. Uso de IP 55,6%, tenofovir en 81% y ITIAN timidínico 47, 4%. Asociación significativa entre hepatopatía crónica, neoplasias no VIH y mortalidad.

### Sexo



### Comorbilidades





*Discusión:* Distribución de sexos similar a otras series, pero edad mayor. Como factores de riesgo cardiovascular destaca tabaquismo. Asociación con enfermedad cardiovascular y nefropatía. Cierta asociación entre ITIAN timidínicos con enfermedad cardiovascular. Asociación significativa con hepatopatía crónica y neoplasias no VIH.

*Conclusiones:* Estudio retrospectivo, no permite conclusiones certeras. Dada la alta prevalencia de tabaquismo asociada a enfermedad cardiovascular sería útil implementar programas de cese tabáquico. Fuerte asociación entre coinfección, hepatopatía crónica y exitus, que refuerza priorizar el tratamiento en coinfectados.

## **Bibliografía**

1. Ghosn J, Taiwo B, Seedat S, et al. HIV. *Lancet*. 2018;392(10148):685-97.
2. Knobel H, Domingo P, Suárez-Lozano I, et al. G Model Rate of cardiovascular, renal and bone disease and their major risks factors in HIV-infected individuals on antiretroviral therapy in Spain. *Enferm Infecc Microbiol Clin*. 2018.
3. Mayer KH, Shirley DK, Kaner RJ, Glesby MJ. Effects of Smoking on Non-AIDS-Related Morbidity in HIV-Infected Patients. *HIV/AIDS*. 2013.
4. Puoti M, Lorenzini P, Cozzi-Lepri A, et al. Incidence and progression to cirrhosis of new hepatitis C virus infections in persons living with human immunodeficiency virus. *Clin Microbiol Infect*, 2016;23:267.