



IC-103 - ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS COMORBILIDADES Y DE LAS COMPLICACIONES EN PACIENTES INGRESADOS CON INSUFICIENCIA CARDÍACA CONGESTIVA ENTRE NOVIEMBRE DE 2018 Y MAYO DE 2019

J. Béjar-Valera¹, M. Miluy-Guerero¹, C. Toledo-Campillo¹ e I. Ramos-Gómez²

¹Medicina Interna. Hospital Rafael Méndez. Lorca (Murcia). ²Medicina Interna. Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).

Resumen

Objetivos: Analizar las comorbilidades y las complicaciones al ingreso de los pacientes ingresados en Medicina Interna que presentaban insuficiencia cardíaca congestiva (ICC).

Material y métodos: Estudio descriptivo de los pacientes que fueron vistos en las guardias de planta de Medicina Interna en el día de su ingreso en planta de hospitalización entre noviembre de 2018 y mayo de 2019 (n = 50). Hemos recogido las siguientes variables: edad, género, número de ingresos previos por ICC, edemas en MMII (miembros inferiores), fracaso renal agudo, edema agudo de pulmón, cardiopatía isquémica previa, fibrilación auricular previa y FEVI (fracción de eyección del ventrículo izquierdo) deprimida. Analizamos los datos mediante el programa estadístico SPSS 23.

Resultados: Las medias de las variables cuantitativas han sido las siguientes: edad: 78,11 (\pm 10,37); número de ingresos previos por ICC: 1,42 (\pm 2,2). Los porcentaje al ingreso de las variables cualitativas fueron: 68,4% mujeres, 57,9% presentaron edemas en MMII, 52,6% fracaso renal agudo, 15,8% edema agudo de pulmón, 26,3% cardiopatía isquémica previa, 52,6% fibrilación auricular previa y 5,3% FEVI deprimida. Encontramos relación estadísticamente significativa entre el fracaso renal agudo al ingreso y el género ($p < 0,005$), edema agudo de pulmón al ingreso y el número de ingresos previos por ICC ($p < 0,047$) y entre la fibrilación auricular previa y la presencia de edemas en MMII al ingreso ($p < 0,04$).

Discusión: No hemos encontrado relación estadísticamente significativa entre los edemas en MMII y la presencia de edema agudo de pulmón al ingreso en nuestra muestra probablemente debido al pequeño tamaño muestral de la misma.

Conclusiones: En nuestra muestra hay una asociación estadísticamente significativa entre el fracaso renal agudo al ingreso y el género, el edema agudo de pulmón al ingreso y el número de ingresos previos por ICC y la fibrilación auricular previa y la presencia de edemas en MMII al ingreso.

Bibliografía

1. Llàcer P, Bayés-Genís A, Núñez J. Antígeno carbohidrato 125 en insuficiencia cardíaca. Nueva era en la monitorización y control del tratamiento. Med Clin. 2019;152(7):249-90. 0014-2565 / © 2020, Elsevier España S.L.U. y Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). Todos los derechos reservados.