



<https://www.revclinesp.es>

IC-013 - ¿HAY DIFERENCIAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL ESTUDIO EPICTER?

M. Romero Correa¹, J. Fernández Martínez¹, E. Guisado Espartero², V. Romaní Costa³, A. Porto Pérez⁴, R. Jordana Camajuncosa⁵, M. Villalonga Comas⁶ y A. Sebastián Leza⁷

B. Sánchez Sauce, R. Ruiz Hueso, J. Recio Iglesias, C. Pedrosa Fraga, I. Vives Beltrán, I. Páez Rubio, J. Carretero Gómez, J. Díez Manglano y P. Salamanca Bautista en representación del Grupo de Trabajo IC y FA

¹Medicina Interna. Hospital Virgen Macarena. Sevilla. ²Medicina Interna. Hospital Comarcal Infanta Margarita. Cabra (Córdoba). ³Medicina Interna. Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Terrassa (Barcelona). ⁴Medicina Interna. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña. A Coruña. ⁵Medicina Interna. Parc Taulí. Sabadell (Barcelona). ⁶Medicina Interna. Hospital Universitario Son Espases. Mallorca (Illes Balears). ⁷Medicina Interna. Hospital Universitario Cruces. Barakaldo (Vizcaya).

Resumen

Objetivos: Analizar posibles diferencias en los resultados del estudio EPICTER en las comunidades autónomas (CC.AA.) de España con mayor número de pacientes incluidos.

Material y métodos: Estudio de prevalencia hospitalario mediante encuesta a pacientes ingresados con IC en 74 centros. Se clasificó a los pacientes en función de si cumplían o no criterios de terminalidad preestablecidos. Se agrupó por CC.AA. y se compararon las variables descritas en la tabla, y otras: síntomas, fármacos, y mortalidad por IC.

| | Galicia (n = 484) | Cataluña (n = 469) | Madrid (n = 455) | Andalucía (n = 739) |
|----------------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| Edad media (años) | 80 | 81 | 84 | 80 |
| Hombres (%) | 55,6 | 46,7 | 44,8 | 47,7 |
| FEVI: Pre/Int/Red (%) | 65/14/21 | 52/13/35 | 61/16/23 | 67/10/23 |
| NYHA III-IV (%) | 27,1 | 25,2 | 20,7 | 25,5 |
| Prevalencia terminales (%) | 23,8 | 35,2 | 17,6 | 23,5 |

| | | | | |
|--------------------------|------|------|------|------|
| Consulta a U. Paliativos | 2,5 | 8,5 | 3,5 | 8,3 |
| Mortalidad a los 6 meses | 27,9 | 25,8 | 21,6 | 24,9 |

Resultados: Se recogieron 3.153 pacientes. En la tabla se muestran los resultados de las variables en las que apreciamos diferencias por CC.AA. Respecto a otras variables analizadas: el síntoma predominante fue la disnea, el fármaco más usado en Galicia y Andalucía fueron las benzodiacepinas, en Madrid y Cataluña la perfusión de furosemida.

Discusión: Las competencias en salud en España están transferidas a las CC.AA., ello motiva diferencias en la gestión del proceso de IC, y esto unido a diferencias demográficas puede explicar que en Madrid se incluyeran más mujeres y de mayor edad, pero con mejor clase funcional, y por tanto con menos prevalencia de terminalidad y menos consultas a paliativos. En Cataluña hubo mayor prevalencia de terminalidad y más consultas a paliativos. En Galicia fue mayor la mortalidad a los 6 meses, con menor proporción de consulta a paliativos.

Conclusiones: 1. Los datos de EPICTER son bastante homogéneos por CC.AA. 2. Las diferencias encontradas por CC.AA. pueden traducir distintas bases poblacionales y diferentes formas de gestión sanitaria del proceso de IC.

Bibliografía

1. Registro RECALCAR. Informe 2017. Disponible en: https://secardiologia.es/images/institucional/sec-calidad/Informe_RECALCAR_2017_FINAL-1.pdf