



## EA-058 - POLIMEDICACIÓN Y DEPRESCRIPCIÓN EN PACIENTES INGRESADOS EN MEDICINA INTERNA

N. García Arenas<sup>1</sup>, R. García Noriega<sup>1</sup>, D. Pérez Martínez<sup>1</sup>, F. Estrada Álvarez<sup>2</sup>, A. Barragán Mateos<sup>1</sup>, A. Álvarez García<sup>1</sup>, D. Olivo Aguilar<sup>1</sup> y D. Castrodá Copa<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Medicina Interna. Hospital San Agustín. Avilés (Asturias). <sup>2</sup>Medicina Interna. Hospital de Cabueñes. Gijón (Asturias).

### Resumen

**Objetivos:** Analizar las características clínicas y el manejo de los pacientes polimedcados que ingresan en un servicio de Medicina Interna.

**Material y métodos:** Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo observacional, donde se revisaron todos los pacientes ingresados en el servicio de Medicina Interna del Hospital San Agustín de Avilés durante el mes de marzo de 2019. Se utilizó el SPSS 19 como programa estadístico.

**Resultados:** Ingresaron 430 pacientes en nuestro servicio en marzo 2019. El 31,6% estaban anticoagulados, la mayoría (63,5%) con acenocumarol. Durante el ingreso, un 55,6% recibió antibioterapia. El 68,8% tomaba más de 5 fármacos; un 16% tomaba de 3 a 5; un 11,2% 3 o menos y solamente un 4% no seguía ningún tratamiento. Entre los polimedcados, la edad media fue de 82,09 años. Como comorbilidades destacaban: HTA (71,3%), dislipemia (43,6%), FA (41,9%), IC (36,8%), ERC (36,8%), DM (36,1%) y demencia (33,1%). El 31,8% eran DABVD. El porcentaje de exitus fue ligeramente más elevado que en el resto de ingresos (10,1% vs 9%), al igual que la estancia media (6,97 vs 5,99). Tras el ingreso, solo se suspendieron tratamientos en el 18,4%, este porcentaje es ligeramente superior en los polimedcados (19,3%).

**Discusión:** La polimedcación es un importante problema de salud; a más fármacos, menor adherencia terapéutica y más riesgo de efectos secundarios y de interacciones medicamentosas, que ocurren con más frecuencia en ancianos. Se asocia a mayor morbilidad, peor calidad de vida y mayor riesgo de caídas. Además, aumenta el consumo de recursos, mayor gasto farmacéutico, riesgo incrementado de hospitalización, reingresos, estancias más prolongadas y aumento de la mortalidad hospitalaria. La mayoría de los pacientes que ingresan en Medicina Interna son pacientes polimedcados, debido a que son pacientes pluripatológicos pero también a la poca deprescripción que realizamos.

**Conclusiones:** El porcentaje de pacientes polimedcados en nuestro servicio es elevado, debido a las características de los pacientes (pluripatológicos, ancianos...) y a que la optimización de tratamiento se realiza en muy pocas ocasiones.

### Bibliografía

1. Boyd CM, Darer J, et al. Clinical practice guidelines and quality of care for older patients with multiple comorbid diseases. Implications for pay for performance. JAMA. 2005;294:716-24.