



V-109 - FACTORES PREDICTORES DE MALIGNIDAD EN PACIENTES REMITIDOS PARA ESTUDIO DE PÉRDIDA DE PESO

Á. Marchán-López, B. Ayuso García, L. Salmerón Godoy, E. García Delicado, K. Campión Álvarez, C. Castillo Maza, C. Arévalo Cañas y S. Mateo Álvarez

Medicina Interna. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

Resumen

Objetivos: Identificar factores clínicos o analíticos que se asocian con diagnóstico final de cáncer en los pacientes valorados por pérdida de peso en la consulta de Medicina Interna de nuestro centro.

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo en un hospital de tercer nivel con la aprobación de la Comisión de Investigación. Se incluyeron todos aquellos pacientes remitidos desde atención primaria en los que el motivo de derivación incluía pérdida de peso.

Resultados: Finalmente se valoraron 153 pacientes por pérdida de peso, entre los que hubo 15 diagnósticos de cáncer (12 tumores sólidos, 3 linfomas). Se compararon las características de los pacientes con y sin cáncer (tabla). En el análisis univariante se encontró tendencia a la asociación entre cáncer y diabetes ($p = 0,073$), adenopatías ($p = 0,103$), pérdida de peso en kilogramos (0,136), valores decrecientes de hemoglobina ($p = 0,010$) y crecientes de RDW ($p = 0,021$), valores crecientes de gamma-glutariltranspeptidasa ($p = 0,105$) e hiperferritinemia ($p = 0,020$). Se realizó un análisis multivariante mediante regresión logística binomial en el que el mejor modelo ($R^2N = 0,506$) incluyendo el RDW (OR 1,87 por cada 1% de aumento) y la hiperferritinemia por encima de 300 ng/mL (OR 9,257).

Características de los pacientes con y sin cáncer

	Cáncer (n = 15)	Sin cáncer (n = 137)
Varones	32,2%	28,6%
Edad	70,0	70,067,1
Charlson	3,14	2,61
Pérdida de peso	8,33	5,24
Hemoglobina	12,1	13,9
RDW	14,4	18,0
Ferritina	145,6	486,5

Discusión: La pérdida de peso es un motivo frecuente de derivación a Medicina Interna, que a menudo implica procesos diagnósticos largos y costosos, además de anticipación diagnóstica del paciente, hasta despistar a una etiología tumoral, que no es la más frecuente. Disponer de

predictores que permitan restringir el estudio resultaría por ello de interés, habiéndose realizado estudios que han propuesto hemoglobina, GGT, FA, LDH, etc. hasta ahora infructuosos. A pesar de la reducida muestra, hemos encontrado asociación entre RDW e hiperferritinemia y diagnóstico de cáncer. Sería interesante ampliar la muestra con la intención de derivar y validar un score diagnóstico que permita optimizar el estudio en consultas de los pacientes con pérdida de peso.

Conclusiones: RDW aumentada e hiperferritinemia se asociaron de manera significativa con el diagnóstico de cáncer entre los pacientes estudiados por pérdida de peso en la consulta de Medicina Interna.

Bibliografía

1. Torné Cachot J. Pérdida de peso involuntaria aislada: epidemiología y factores predictivos de malignidad. Med Clin (Barc). 2018;152(10):377-424.