Rev Clin Esp. 2021;221(Espec Congr):276

Revista Clínica Española

https://www.revclinesp.es

CO-236 - CARACTERÍSTICAS SOCIOFAMILIARES DE LA SITUACIÓN DE ÚLTIMOS DÍAS EN PACIENTES CON PCR DE COVID-19 POSITIVA QUE FALLECEN EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

C.M. García Martínez, M. Navío Botías y J. Ramírez Taboada

Medicina Interna. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

Resumen

Objetivos: Conocer las condiciones socio-familiares en las que se produjo la situación de últimos días de los pacientes ingresados por COVID-19 que requirieron una sedación paliativa.

Métodos: Estudio descriptivo de las características del proceso de sedación paliativa y sus circunstancias socio-familiares, en los pacientes COVID-19 positivos que fallecieron durante el ingreso entre marzo y mayo de 2020 en nuestro centro.

Resultados: De los 121 pacientes fallecidos en nuestro centro, solo 74 pacientes (61,15%) lo hicieron tras el inicio de una sedación paliativa. La edad media fue de 79,82 años con un 51,4% de varones y el 48,6% mujeres. Dadas las condiciones especiales de situación de pandemia y estado de alarma, la información a familiares se realizó de forma telefónica, comunicándose en todos los casos, el estado de gravedad y el inicio de sedación paliativa para el control de síntomas (99,2% de las veces, con excepción de un paciente que carecía de familiares allegados a los que informar). Según variabilidad de protocolos y disponibilidad de medidas que aseguraran una correcta protección individual, se informó de la posibilidad de visitar al paciente durante su situación de últimos días, para garantizar la despedida. Sin embargo, únicamente en un 19,8% de los casos pudo llevarse a cabo, pudiendo ofrecerse una habitación individual a tal efecto, en, aproximadamente, la mitad de los casos (50,4%).

Conclusiones: Más de la mitad de los pacientes fallecidos en nuestro centro a causa del Covid-19 requirieron de sedación paliativa para control de síntomas, situación que fue transmitida en la totalidad de los casos a los familiares directos vía telefónica, con el consiguiente consentimiento verbal por su parte. En la mitad de los casos se pudo disponer de una habitación individual a tal efecto y en la medida de las circunstancias, se ofertó la posibilidad de visitar al paciente para su acompañamiento y despedida por parte de la familia, pudiendo llegar a darse dicha situación, en un porcentaje muy pequeño de casos.

Bibliografía

1. Borasio GD, Gamondi C, Obrist M, Jox R, For The Covid-Task Force Of Palliative Ch. COVID-19: decision making and palliative care. Swiss Med Wkly. 2020;150:w20233.

0014-2565 / © 2020, Elsevier España S.L.U. y Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). Todos los derechos reservados.