



## CO-366 - COVID-19 Y BAJAS LABORALES, ¿UNA PRIMERA LLAMADA DE ATENCIÓN SOBRE LA APARICIÓN DE LA PANDEMIA?

M.Á. Sánchez-Chaparro<sup>1</sup>, E. Calvo-Bonacho<sup>2</sup>, C. Catalina-Romero<sup>2</sup>, C. Fernández-Labander<sup>2</sup>, A. Fernández-Meseguer<sup>2</sup>, L. Quevedo Aguado<sup>2</sup>, P. Martínez-Muñoz<sup>2</sup> y P. Valdivielso<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Hospital Virgen de la Victoria. Málaga. <sup>2</sup>Dirección de Gestión del Conocimiento e Innovación. Ibermutua. Mutua colaboradora con la Seguridad Social.

### Resumen

**Objetivos:** La pandemia mundial de COVID-19 (enfermedad del coronavirus-2019) causada por el virus SARS-CoV-2 ha impactado sustancialmente en la salud de la población laboral. El objetivo de este estudio fue evaluar si el seguimiento de los incrementos de las bajas laborales (BL) podrían ayudar a anticipar la situación pandémica y estimar futuros rebrotes.

**Métodos:** Análisis comparativo de las BL registradas en Ibermutua, mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274, empleando los códigos CIE-9-CM, durante el mes de marzo de 2020, respecto al mismo mes de los años 2017-2019. Las BL se estratificaron por causas, sexo y sectores de actividad ajustándose por el número de afiliados en cada período.

**Resultados:** En marzo de 2020, respecto al mismo mes de años previos, hubo un aumento sin precedentes (116%) del total de BL, principalmente debidas a enfermedades infecciosas y respiratorias. Las enfermedades cardiovasculares se mantuvieron estables. El mayor incremento se observó entre los trabajadores del sector sanitario (457%); así como en las BL relacionadas con exposición a enfermedades contagiosas.

**Discusión:** El incremento experimentado en las BL durante marzo de 2020, resulta compatible con el brote COVID-19, mientras, otras enfermedades no relacionadas con COVID-19 se mantuvieron estables. El diagnóstico específico de BL-COVID-19 (Codificación, Ministerio de Sanidad, 6/03/2020) se incrementó de acuerdo a la literatura y a la situación registrada en nuestro país.

**Conclusiones:** El seguimiento de las BL por enfermedad común puede contribuir a anticipar la pandemia; así como los rebrotes relacionados; y a implementar precozmente medidas preventivas en los lugares de trabajo.

### Bibliografía

1. Pollán M, et al. Prevalence of SARS-CoV-2 in Spain (ENE-COVID): a nationwide, population-based seroepidemiological study. Lancet. 2020:S0140-6736(20)31483-5.
2. Groenewold MR, et al. Increases in Health-Related Workplace Absenteeism Among Workers in Essential Critical Infrastructure Occupations During the COVID-19 Pandemic - United States,

March-April 2020. Wkly Rep. 2020;69(27):853-8.