



<https://www.revclinesp.es>

## CO-310 - RELACIÓN ENTRE EL PATRÓN DE LA ANGIOTC Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES CON INFECCIÓN POR SARS-COV2

*P. Nadal Gómez, A. Rodríguez Cobo, M.E. Caro Tinoco, R. Suárez-Villar, C. Risco Risco, D. Martínez-Urbistondo, M. Agud Fernández y P. Villares Fernández*

*Medicina Interna. Hospital Universitario Madrid Sanchinarro. Madrid.*

### Resumen

**Objetivos:** Varios estudios han descrito un riesgo aumentado de enfermedad tromboembólica (ETEV) en los pacientes con SARS-CoV2. La angiografía pulmonar por tomografía computarizada (angioTC) es el método de elección para el diagnóstico de la embolia pulmonar. El mapa de yodo añade a la anterior información adicional sobre la perfusión pulmonar. El objetivo de nuestro estudio es analizar las diferencias entre los pacientes con tromboembolismo pulmonar, los que solo presentaron alteraciones de la perfusión y los que presentaron una angioTC negativa.

**Métodos:** Estudio observacional retrospectivo de 161 pacientes con infección por SARS-CoV2 a los que se realizó una angioTC pulmonar con mapa de yodo por sospecha de embolia pulmonar en el período comprendido desde el 6 de marzo hasta el 19 de mayo de 2020. Se recogieron y analizaron las diferencias entre sus datos basales, la escala Geneva simplificada, la SpO2/FiO2 a la realización de la TC y el resultado de la angioTC de tórax (sin alteraciones, embolia pulmonar o hipoperfusión).

**Resultados:** Los resultados de la angioTC fueron: 74 (46%) sin alteraciones, 44 (27%) embolia pulmonar y 43 (27%) datos de hipoperfusión pulmonar sin trombo visible con una media de comorbilidad según el Índice de Charlson de 4, 3 y 3,5 puntos respectivamente ( $p = 0,05$ ). La media de la escala Geneva fue de 4,7 puntos, 4 puntos y 4,4 puntos en los distintos grupos ( $p = 0,07$ ). Por último, la SpO2/FiO2 media fue de 323, 231 y 316 mmHg respectivamente ( $p = 0,05$ ).

**Discusión:** Los resultados de nuestra serie demuestran que los patrones de la angioTC se asocian de forma distinta a las características basales y la SpO2/FiO2 de los pacientes al someterse a la prueba. La utilidad de estos resultados está estrechamente ligada a la realización de estudios que permitan evaluar la implicación pronóstica de estos hallazgos.

**Conclusiones:** El patrón de perfusión de la angioTC se correlaciona con distintas características basales y de SpO2/FiO2 en los pacientes con COVID.

### Bibliografía

1. Grillet F, Behr K, Calame P, Aubry S, Delabrousse E. Acute Pulmonary Embolism Associated with COVID-19 Pneumonia Detected by Pulmonary CT Angiography. Radiology. 2020.