



<https://www.revclinesp.es>

## CO-188 - MANIFESTACIONES CUTÁNEAS EN PACIENTES CON COVID-19: ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE UNA COHORTE DE PACIENTES

F. Maroto Piñeiro<sup>1</sup>, A.B. Sanjurjo Rivo<sup>1</sup>, B. Vilas Pío<sup>1</sup>, J.L. Lamas Ferreiro<sup>1</sup>, J. Álvarez Otero<sup>1</sup> y J. de la Fuente Aguado<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Medicina Interna. Hospital Povisa S.A. Vigo (Pontevedra).

### Resumen

**Objetivos:** Describir las características clínicas de la afectación cutánea por COVID-19 en una cohorte de pacientes ingresados en nuestro centro.

**Métodos:** Se realizó una base de datos que incluía pacientes ingresados y ambulatorios diagnosticados de COVID-19. y que desarrollaron lesiones cutáneas durante el seguimiento. Los pacientes firmaron consentimiento informado y el estudio ha sido aprobado por la Comisión de Docencia de nuestro centro.

**Resultados:** Se incluyeron 13 pacientes con lesiones cutáneas durante el periodo de seguimiento domiciliario. La media de edad fue de 63 años (intervalo 37-81). La media de días desde el inicio de síntomas hasta la aparición de las lesiones cutáneas fue de 31 días (intervalo 19-36). El patrón predominante fue de lesiones eritematosas pruriginosas de aparición en tronco y raíz de extremidades (figs.). Se realizó biopsia cutánea en 6 de ellos. En todas las biopsias el patrón encontrado fue el de dermatitis perivascular superficial, que en dos de los seis casos presentaban positividad débil focal para depósito de IgG e IgM en membrana basal, siendo todas ellas negativas para depósito de complemento.

IMAGEN 1



## IMAGEN 2



*Discusión:* Se han descrito varios patrones de lesiones asociadas a la COVID-19, entre ellas el rash maculo-papular pruriginoso<sup>1</sup>. En un estudio realizado en España<sup>2</sup> el patrón macuto-papular se asoció a peor evolución.

*Conclusiones:* En nuestra serie de casos, la totalidad de pacientes presentó un patrón de lesiones maculares pruriginosas de distribución en tronco y extremidades, con histología compatible con dermatitis linfocitaria perivascular.

## Bibliografía

1. Elmas ÖF, Demirbá A, Özyurt K, Atasoy M, Türsen Ü. Cutaneous manifestations of COVID-19: A review of the published literature. *Dermatologic Therapy*. 2020;e13696.
2. Galván Casas C, Català A, et al. Classification of the cutaneous manifestations of COVID-19: a rapid prospective nationwide consensus study in Spain with 375 cases. *Br J Dermatol*. 2020;doi:10.1111/bjd.19163.