



## T-046 - PERFILES DE PACIENTES CON ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA EN URGENCIAS Y SU ASOCIACIÓN CON EL PRONÓSTICO A MEDIO PLAZO: REGISTRO ESPHERIA

J. Carriel Mancilla<sup>1</sup>, S. Jiménez Hernández<sup>2</sup>, F. Martín Sánchez<sup>3</sup>, D. Jiménez<sup>4</sup>, R. Lecumberri<sup>5</sup>, H. Alonso Valle<sup>6</sup>, F. Beddar Chaib<sup>7</sup> y P. Ruiz Artacho<sup>8</sup>

J. Abelaira, P. Aparicio, A. Ortega, M. Merlo, J. Castillo, V. Sendin, A. Antolin, O. Troiano y L. Lozano en representación del Grupo de Trabajo ETV-SEMES

<sup>1</sup>Medicina interna. Hospital de la Zarzuela. Madrid. <sup>2</sup>Urgencias. Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. Barcelona. <sup>3</sup>Urgencias. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. <sup>4</sup>Neumología. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. <sup>5</sup>Hematología. Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona/Iruña (Navarra). <sup>6</sup>Urgencias. Hospital de Valdecilla. Santander (Cantabria). <sup>7</sup>Urgencias. Complejo Asistencial de Soria. Soria. <sup>8</sup>Medicina interna. Clínica Universidad de Navarra. Madrid.

### Resumen

**Objetivos:** Describir los perfiles de pacientes con enfermedad tromboembólica venosa (ETV) y su asociación con el pronóstico a medio plazo: Registro ESPHERIA.

**Métodos:** Análisis secundario del registro ESPHERIA que incluye pacientes consecutivos con ETV sintomática en 53 Servicios de Urgencias (SU). Se dividió la muestra en 4 perfiles en función de sus antecedentes y factores de riesgo de desarrollo de ETV: ETV no provocada (perfil 1), ETV provocada por factores de riesgo transitorios (perfil 2), cáncer (perfil 3) y baja reserva cardiopulmonar (perfil 4). La variable de resultado fue la compuesta mortalidad y reingreso por cualquier causa a 180 días

**Resultados:** Se incluyeron 773 pacientes de los cuales 450 (58,2%) fueron clasificados en el perfil 1, 128 (16,6%) en el perfil 2, 115 pacientes (14,9%) en el perfil 3 y 80 (10,3%) en el perfil 4. Se documentaron diferencias demográficas, comorbilidad, presentación clínica, tipo de ETV, manejo, ubicación y resultados entre los perfiles clínicos. Ciento noventa y cinco (25,2%) pacientes presentaron un resultado adverso compuesto a los 180 días, de los cuales 69 (8,9%) fallecieron y 179 (23,2%) sufrieron un nuevo ingreso por cualquier causa. La ETV asociada a baja reserva cardiopulmonar (HR 1,73 [IC95% 1,12-2,68; p = 0,01]) y la ETV asociada a cáncer (HR 3,10 [IC95% 2,22-4,34; p < 0,001]) se asociaron de forma independiente con sufrir un resultado adverso en los primeros 180 días.

**Discusión:** La clasificación de perfiles clínicos, según factores de riesgo y comorbilidades, en el momento del diagnóstico de la ETV en Urgencias ha mostrado utilidad a la hora de estimar el pronóstico en los primeros 180 días.

**Conclusiones:** Esta clasificación podría ser de ayuda de cara a establecer un plan de cuidados y seguimiento en los pacientes diagnosticados de ETV en los SU.

## **Bibliografía**

1. Jiménez S, Ruiz-Artacho P, Merlo M, Suero C, Antolin A, Sánchez M, et al. Risk profile, management, and outcomes of patients with venous thromboembolism attended in Spanish Emergency Departments: The ESPHERIA registry. *Med.* 2017;96(48):e8796.