



<https://www.revclinesp.es>

I-029 - BÚSQUEDA DE PACIENTES CON HEPATITIS C CRÓNICA PERDIDOS EN EL SISTEMA EN UN HOSPITAL TERCIARIO: UN PROBLEMA TODAVÍA POR RESOLVER

M.D.M. Arcos¹, I. Andaluz², C. Busca¹, L. Martín- Carbonero¹, M.L. Montes¹, J. González¹, M.D. Montero³ y A. Olveira²

¹Medicina Interna, ²Digestivo, ³Microbiología. Hospital Universitario La Paz. Madrid.


Resumen

Objetivos: Tras el uso generalizado de antivirales de acción directa para el tratamiento de pacientes diagnosticados de hepatitis C crónica existe un interés creciente en la eliminación de esta infección. Se han recomendado diversas estrategias de búsqueda de personas no diagnosticadas.

Métodos: Se analizó a los pacientes con serología VHC positiva en el laboratorio de Microbiología del hospital entre 2010-2018 excluyéndose aquellos con PCR-ARN VHC consecutiva negativa. Se consultaron las bases de datos hospitalaria y de la comunidad autónoma definiéndose como: 1) VHC crónico: última determinación de ARN VHC disponible positiva, 2) VHC curado: última determinación de ARN VHC disponible negativa tras ? 12 semanas de fin de tratamiento, 3) posible VHC: serología VHC positiva sin determinación de ARN VHC disponible. Se consideraron perdidos los pacientes con VHC crónico o posible sin seguimiento o cita próxima con Digestivo/M. Interna. Se realizó un análisis descriptivo de todas las variables. El estudio fue revisado y aprobado por el Comité de Ética del centro.

Resultados: Se identificaron 4.592 pacientes con serología positiva para VHC: 3.266 con ARN detectable y 1.326 sin determinación de ARN. Se detectaron 677 pacientes perdidos en el sistema (14,7%): 61% varones, 12% extranjeros, 95% monoinfectados (no VIH), edad mediana 54 años (45-69). La solicitud a Microbiología de los pacientes perdidos fue realizada en un 11% de los casos por M. Interna, 14% Digestivo, 33% A. Primaria y 42% por otras especialidades. De los perdidos, 288 presentaban PCR-ARN VHC positiva y 449 solo serología positiva. La clasificación del resto de los pacientes se muestra en la figura.

Figura 1. Diagrama de flujo de los pacientes del estudio.



* Curados en fecha anterior a 2010 o posterior a 2018 en nuestro centro o curación en otros centros/ fuera de la comunidad autónoma (datos obtenidos a través de informes médicos).

** Valoración próxima en consulta, tratamiento activo aún no finalizado o decisión de no tratamiento por edad, comorbilidad, negativa del paciente, abuso de sustancias, mal cumplimiento terapéutico etc.

Conclusiones: A pesar de la posibilidad generalizada de tratamiento del VHC en España desde 2015, existe un número significativo de pacientes con hepatitis C perdidos en el sistema. Es necesario implementar estrategias de detección activa de estos pacientes para lograr el objetivo de la eliminación.

Bibliografía

1. Kracht PAM, Arends JE, van Erpecum KJ, et al. REtrieval And cure of Chronic Hepatitis C (REACH): Results of micro-elimination in the Utrecht province. Liver Int. 2019;39(3):455-62.