



## IF-024 - ENFERMEDADES AUTOINMUNES SISTÉMICAS E INFECCIÓN POR SARS COV-2

S. Castañeda Pérez<sup>1</sup>, S. Moragón Ledesma<sup>1</sup>, C. González San Narciso<sup>1</sup>, C. Millán Nohales<sup>1</sup>, A.A. Gurjián Arena<sup>1</sup>, G. Villarreal Paúl<sup>1</sup>, B. Pinilla Llorente<sup>1</sup> y M.V. García Villalba<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Medicina Interna-Unidad de EAS. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid.

### Resumen

**Objetivos:** Realizar un estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes pertenecientes a una consulta de enfermedades autoinmunes sistémicas (EAS) diagnosticados de infección por SARS-CoV-2.

**Métodos:** Revisión de historias clínicas de los pacientes con seguimiento en la consulta de EAS de un hospital de tercer nivel.

**Resultados:** Se analizaron 130 pacientes, con edad media de 64,7 años, el 73,1% eran mujeres. Reciben tratamiento con corticoides (36,9%), hidroxicloroquina (25,4%), micofenolato de mofetilo (7,7%), azatioprina (6,9%), metrotexato (6,2%), colchicina (5,4%), anticuerpos monoclonales (3,1%) y antagonistas de receptor (0,8%), ninguno fue interrumpidos. Consultaron por sintomatología compatible con COVID19 16 y 2 presentaron exudado nasofaríngeo positivo para SARS-COV2. Ninguno precisó ingreso hospitalario y la evolución fue favorable. Caso 1: Varón de 72 años, latinoamericano, con Síndrome de Sjögren, sin tratamiento inmunosupresor. Presentó sintomatología leve con infiltrado radiológico bilateral. Caso 2: mujer de 58 años, caucásica, con esclerodermia en tratamiento con prednisona y micofenolato.

**Discusión:** Las EAS pueden suponer un riesgo incrementado de infección viral por la disregulación del sistema inmune o terapia inmunosupresora<sup>1,2</sup>. Se desconoce si se asocian con la infección por SARS-CoV-2 o si la inmunosupresión presenta riesgo adicional<sup>2</sup>. Pese a que hacen falta más estudios llama la atención la escasa incidencia de la enfermedad en nuestra muestra.

**Conclusiones:** La asociación entre infección por SARS-CoV-2 y las EAS está aún por esclarecer<sup>2</sup>. En nuestro estudio no encontramos asociación entre enfermedad autoinmune e infección por SARS-COV2.

### Bibliografía

1. Amene S, Nima R. Towards treatment planning of COVID-19: Rationale and hypothesis for the use of multiple immunosuppressive agents: Anti-antibodies, immunoglobulins, and corticosteroids. *Int Immunopharmacol.* 2020;84:106560.
2. Schulze-Koops H, Specker C, Iking-Konert C, et al. Preliminary recommendations of the

German Society of Rheumatology (DGRh eV) for the management of patients with inflammatory rheumatic diseases during the SARS-CoV-2/COVID-19 pandemic. *Ann Rheum Dis.* 2020;79:840-1.