



## V-049 - PACIENTES MAYORES DE 65 AÑOS CON NECESIDAD DE REALIZACIÓN DE UNA VENTANA PERICÁRDICA. SERIE DE CASOS

Á.M. Nieto González<sup>1</sup>, M. Prieto Giraldez<sup>1</sup>, J. Vázquez González<sup>1</sup>, B. Díaz-Tendero<sup>1</sup>, B. Moreno Torres<sup>2</sup>, C. Morata Romero<sup>1</sup> y A.M. Alguacil Muñoz<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Medicina interna, <sup>2</sup>Anatomía patológica. Complejo Hospitalario de Toledo. Toledo.

### Resumen

**Objetivos:** La ventana pericárdica es un procedimiento realizado en los pacientes con derrame pericárdico severo con fines diagnósticos o terapéuticos. Nuestro objetivo es describir las características de los pacientes mayores de 65 años poco representados en los estudios y que precisaron su realización en nuestra área de salud.

**Métodos:** Estudio retrospectivo de 76 pacientes  $\geq$  65 años de un registro de 139 pacientes adultos sometidos a una ventana pericárdica con toma de biopsia del 2000 al 2018. Se recogieron las características clínicas, analíticas, microbiológicas y anatomopatológicas. Se excluyeron los casos con información incompleta. Fueron comparados con pacientes menores de 65 años de ese mismo registro. El análisis estadístico se realizó con SPSS.V22.

**Resultados:** El rango de edades fue de 65 a 89 años, 44 (57,8%) eran varones. 7 pacientes cursaron con la triada de Beck siendo significativamente mayor ( $p$  0,039) que en los  $<$  65 años; al igual que la ingurgitación yugular en 32 pacientes (42,1%), ( $p$  0,012). 44 pacientes presentaron taponamiento cardíaco, sin diferencias respecto a los  $<$  65 años. Tampoco hubo diferencias entre ambos grupos con respecto a los datos analíticos y reactantes de fase aguda. La pericarditis idiopática fue la principal etiología (43,3%) significativamente más frecuente que en  $<$  65 años ( $p$  0,025). La forma crónica estuvo presente en el 14,7% con desarrollo de pericarditis constrictiva en solo 4,4%. La etiología tumoral metastásica correspondió exclusivamente a adenocarcinomas y de forma significativa en los 65 años ( $p$  0,025). No hubo diferencias respecto a otras causas.

**Discusión:** La ventana pericárdica es una técnica diagnóstica y terapéutica. En mayores de 65 años la triada de Beck fue más frecuente y predominó la causa idiopática como en otros estudios.

**Conclusiones:** La edad puede condicionar la forma de presentación clínica en los pacientes en los que ha sido necesario la realización de una ventana pericárdica.

### Bibliografía

1. Sakanoue I, Hamakawa H, Okubo Y, et al. Efficacy and safety of thoracoscopic pericardial window in patients with pericardial effusions: a single-center case series. J Cardiothorac Surg. 2016;11(1):92.