

Revista Clínica Española



https://www.revclinesp.es

627 - INCIDENCIA DE EVENTOS TROMBÓTICOS EN PACIENTES CON COVID-19 Y DÍMERO D DE 5.000 A 10.000 µg/L Y MAYOR DE 10.000 µg/L EN UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL EN LA PRIMERA OLA DE LA PANDEMIA EN ESPAÑA

D. Alegre GonzÁlez, S. MartÍnez HernÁndez, E. MenÉndez FernÁndez, E. Rabadan Pejenaute, J. Collado SÁenz, B. Dendariena Borque y R. Daroca PÉrez

Hospital San Pedro. LogroÑo.

Resumen

Objetivos: Analizar la incidencia de eventos trombóticos a corto y medio plazo en los pacientes con niveles elevados de dímero D (DD), estratificados en 2 niveles, en la COVID-19.

Métodos: Estudio comparativo retrospectivo. Se incluyeron los pacientes ingresados por COVID-19 en un hospital de 2° nivel durante la primera ola de la pandemia en España (del 15/03/2020 al 30/04/2020) y que tenían al menos 1 determinación de DD de más de 10.000 μg/L (grupo DD > 10.000) y los que tenían al menos una determinación entre 5.000 y 10.000 y ninguna superior a 10.000 μg/L (grupo DD 5.000-10.000). Comparamos la incidencia de eventos trombóticos en los primeros 28 días y desde el día 29 hasta los 6 meses del alta. Este estudio ha sido aprobado por el Comité Ético de Investigación de nuestro hospital

Resultados: Se analizaron 34 pacientes con DD > 10.000 (media de edad 74,3 años, 29,4% mujeres) y 28 pacientes con DD 5.000-10.000 (media de edad 71,6 años, 35,7% mujeres). La comparación entre ambos grupos de la incidencia de eventos trombóticos durante los primeros 28 días y en el período de 29 días a 6 meses se muestran en la tabla.

	Grupo 1: DD 5.000-10.000		Grupo 2: DD > 10.000	
Tiempo	28 días	29 días -6 meses	28 días	29 días -6 meses
Pacientes	28	23	34	24
TVP	7,14%	4,3%	2,94%	12,5%
TEP	10,71%	0%	5,88%	4,16%
Total trombosis	17,85%	4,3%	8,82%	16,66%

Conclusiones: Los pacientes que ingresan por COVID-19 y tienen un DD muy elevado presentan una alta incidencia de eventos trombóticos venosos, sobre 1 de cada 4 pacientes a 6 meses en nuestro estudio. No hubo diferencias significativas entres los 2 grupos de estratificación de DD en cuanto a la incidencia global o tipo de evento trombótico. Los pacientes del grupo de DD más elevado mostraron mayor incidencia de eventos trombóticos tardíos, siendo en este caso la TVP el evento predominante.

0014-2565 / © 2021, Elsevier España S.L.U. y Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). Todos los derechos reservados.