

## Revista Clínica Española



https://www.revclinesp.es

## 216 - EFICACIA DE LA TELEMEDICINA CON TELEMONITORIZACIÓN EN EL CONTROL DOMICILIARIO DE PACIENTES CON COVID-19

**C. Pedrosa Fraga**, R. Suárez Gil, I. Iñiguez Vázquez, J. Liñares Martínez, M. Bal Alvaredo, J.Á. Fernández Rial y E. Casariego Vales

Hospital Universitario Lucus Augusti. Lugo.

## Resumen

*Objetivos:* Evaluar si la telemedicina con telemonitorización es una herramienta clínicamente útil y segura en el seguimiento domiciliario de pacientes con COVID-19.

*Métodos:* Estudio retrospectivo de cohortes de todos los pacientes diagnosticados de COVID-19 (PCR positiva y/o Ag.) en Galicia entre el 26 de diciembre de 2020 y el 15 de febrero de 2021. Se evalúa el seguimiento domiciliario estructurado y proactivo con telemedicina y telemonitorización (programa TELEA) en los pacientes considerados de alto riesgo en el Área de Lugo, A Mariña y Monforte (ASLAM) frente al convencional por Atención Primaria o por modelos incompletos de telemedicina en las restantes Áreas Sanitarias de Galicia.

Resultados: En Galicia, en dicho período, se diagnosticaron 47.053 pacientes, 4.384 (9,3%) en el ASLAM. De ellos 1.187 (27,1%) se siguieron con TELEA y los restantes (3197 en el ASLAM y 42.669 en el resto de Galicia) por otros métodos. Aunque los pacientes seguidos por TELEA fueron de mayor edad, acudieron menos a Urgencias hospitalarias (p = 0,05), ingresó un número menor (p < 0,01), su estancia hospitalaria fue más corta (p < 0,0001) y en su primer ingreso hospitalario la mortalidad fue menor (p = 0,03). Ajustando por edad, en el ASLAM se registraron 17,6 vs. 29,2 fallecimientos/100.000 habitantes en el resto de Galicia. Entre los pacientes en control domiciliario fallecieron 4 pacientes (0,3%), con enfermedades previas fatales a corto plazo y con acuerdos de evitar el traslado hospitalario y no se registraron otras urgencias vitales.

Primer contacto telefónico con el paciente

Identificación y presentación

Justificación de la llamada

Explicar seguimiento

Determinar tipo de seguimiento en base encuesta de evolución clínica, características del paciente y riesgo de probabilidad

Trasladar al facultativo incidencias de la primera valoración (grado de obesidad, puérperas, problemática social u otras)

Tipos de seguimiento


Edad


Edad media; DE


		A	В	С	D				
Acciones enfermer a	Criterios de inclusión	Menos de 8 días de evolución + síntomas	Menos de 8 días de evolución + síntomas	Menos de 8 días de evolución + síntomas leves	Más de 4 días de evolución. No síntomas				
	Revisar biomedidas T <sup>a</sup> y Sat.O2 tres veces al día		Contacto telefónico con el paciente todos los días 08 y	Contacto telefónico con el paciente días alternos					
	Revisar encuesta sintomática 1º hora del día				El paciente comunicará				
	Contacto telefónico con el paciente una vez al día		20h Realizar encuesta sintomática	Realizar encuesta sintomática y C/Tª	cambio de				
			C/T <sup>a</sup> y Saturación de O2	Contacto telefónico con el paciente días alternos	su situación clínica				
	Trasladar incide	Trasladar incidencias al facultativo si fuese necesario							
Acciones del paciente	Control de biomedidas ( $T^a$ y Sat.O2) 08-09h, 14-15h, 19-20h		Control de	Control de T	Control do				
	Cubrir encuesta (08-09h) Introducir datos		(T <sup>a</sup> y Sat.O2)	c/8 h	T <sup>a</sup> c/8 h				
	biomedidas en App Telea Comunicar al equipo de enfermería de teleseguimiento signos y síntomas de alarma								
Acciones del facultativ o	Contactar con el paciente para resolver alertas comunicadas por enfermería								
	Derivar al paciente al servicio de urgencias si es necesario								
	Comunicar al servicio de urgencias el traslado								
	Alta del paciente								
Sexo (vard	ón)			Pacier 596 (5	ites en seguimiento ( $N = 1.187$ ) (0,3%)				

65,6; 15,9 años

Rango			15-99				
Grupos de edad							
18-40				92 (7,7%)			
41-50			120 (10,1%)				
51-60				194 (16,3%)			
61-70				285 (24,1%)			
71-80				279 (23,5%)			
81-90				182 (15,4%)			
≥ 91				35 (2,9%)			
Tiempo inic	cio síntoma	as-inicio telemedio	cina : media; DS	1,9; 2,9 días			
Hipertensić	ón arterial			658 (55,5%)			
Diabetes m	ellitus			266 (22,4%)			
Obesidad (I	IMC > 33)			178 (15%)			
Arritmia ca	rdíaca			92 (7,8%)			
Inmunodep	resión			82 (6,9%)			
Neoplasia no hematológica				76 (6,4%)			
Cardiopatía isquémica				68 (5,7%)			
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica				58 (4,9%)			
Asma				56 (4,7%)			
Insuficienci	ia cardíaca	1	36 (3%)				
Enfermeda	d renal cró	ónica	26 (2,2%)				
Enfermeda	d hepática	crónica	21 (1,8%)				
Enfermedae	d hematolo	ógica	16 (1,3%)				
Embarazo			14 (1,2%)				
	Casos	Primera visita a urgencias	Ingreso hospitalario	Estancia en días (media- DE)	Fallecimiento durante la hospitalización		
ASLAM	4.384 (9,3%)	552 (12,59%)	262 (47,46%)	8,16 (6,31)	30 (11,45%)		
Resto de Galicia	42.669 (90,7%)	5.827 (13,65%)	3.095 (53,11%)	10,48 (7,99)	511 (16,51%)		
p		0,05	0,001	0,0001	0,03		







riempo en seguimento por reiemedicina (dias)

Conclusiones: Estos datos sugieren que en pacientes con COVID-19 una organización asistencial que integra control domiciliario proactivo con telemedicina y telemonitorización se asocia a la reducción de la presión hospitalaria y a una menor mortalidad.

## Bibliografía

- 1. Martínez-García M, Bal-Alvarado M, Santos Guerra F, Ares-Rico R, Suárez-Gil R, Rodríguez-Álvarez A, et al.; en nombre del Equipo de Seguimiento Compartido TELEA-COVID Lugo; Equipo TELEA COVID-19 (Lugo). Monitoring of COVID-19 patients by telemedicine with telemonitoring. Rev Clin Esp. 2020;220(8):472-9.
- 2. O'Keefe JB, Tong EJ, O'Keefe GD, Tong DC. Description of symptom course in a telemedicine monitoring clinic for acute symptomatic COVID-19: a retrospective cohort study. BMJ Open. 2021;11(3):e044154.
- 3. O'Keefe JB, Tong EJ, Taylor TH Jr, O'Keefe GAD, Tong DC. Use of a Telemedicine Risk Assessment Tool to Predict the Risk of Hospitalization of 496 Outpatients with COVID-19: Retrospective Analysis. JMIR Public Health Surveill. 2021 Feb 26. doi: 10.2196/25075.
- 4. Instituto Nacional de Estadística. Cifras oficiales de población. Disponible en: https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t = 2853. Consultado el 10 de abril de 2021.
- 5. Batsis JA, DiMilia PR, Seo LM, Fortuna KL, Kennedy MA, Blunt HB, et al. Effectiveness of ambulatory telemedicine care in older adults: A systematic review. J Am Geriatr Soc. 2019;67:1737-49.
- 6. Young JD, Abdel-Massih R, Herchline T, McCurdy L, MoyerKJ, Scott JD, et al. Infectious Diseases Society of America Position Statement on telehealth and telemedicine as applied to the practice of infectious diseases. Clin Infect Dis. 2019;68:1437-43.