



828 - ANÁLISIS DESCRIPTIVO SOBRE LOS CASOS DE PERITONITIS BACTERIANA ESPONTÁNEA (PBE) EN UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL ASISTENCIAL

S.L. **Kamel Rey**, B. Alonso Martínez, L. Martín Rojo, C. Molina Ruiz, L. Cayuela Rodríguez y K.M. Pinto Tapia

Hospital Universitario Severo Ochoa. Leganés. Madrid.

Resumen

Objetivos: Analizar las características epidemiológicas de una muestra de pacientes con PBE ingresados en una planta médica en un hospital de segundo nivel asistencial.

Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes con diagnóstico de PBE recogido del archivo general del Hospital Universitario Severo Ochoa entre el 01/01/2010 y el 01/04/2021. Para el análisis se empleó Excel versión 2019.

Resultados: De los 44 pacientes recogidos el 66% fueron hombres, con una media de edad de 66,4 años (DE 12). Del total de pacientes diagnosticados, el 82% presentaban diagnóstico de cirrosis, siendo el 52,8% de origen enólico, el 27,8% de origen viral, el 8,3% mixto y el 11,1% restante secundario a otras etiologías. El 50% de los pacientes estaban categorizados como Child C al ingreso. La mediana de días de hospitalización fue de 16, diagnosticándose el 47,7% de los pacientes en las primeras 24 h. Del total de pacientes de la muestra, 2 de las infecciones registradas fueron nosocomiales. El 25% de los casos presentaron hemorragia digestiva en los 7 días previos al diagnóstico. El 15,9% desarrollaron fracaso renal agudo cumpliendo criterios de síndrome hepatorenal secundario. La mortalidad a los 30 días fue de 47,7%, y al año de 63,6%. La recurrencia al año fue del 9% (N = 4) realizándose profilaxis al alta únicamente en un 29,5% de pacientes (N = 13).

Discusión: Los resultados obtenidos son superponibles a los observados en otros estudios evidenciándose predominio de la infección en varones y en pacientes con hepatopatía avanzada. Se trata de una patología severa con elevado índice de mortalidad y múltiples complicaciones secundarias asociadas.

Conclusiones: Dado que se trata de una infección con un índice de mortalidad nada desdeñable, es necesario incidir en el diagnóstico y tratamiento precoz de la misma y en las medidas de prevención disponibles tanto para evitar episodios recurrentes, como para evitar posibles complicaciones asociadas.

Bibliografía

1. Suárez Fuentetaja R, et al. Estudio descriptivo sobre peritonitis bacteriana espontánea en pacientes cirróticos durante el período comprendido entre 2011-2015 en el Complejo

