



987 - INFLUENCIA DEL CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICA EN PACIENTES ANCIANOS CON IC CRÓNICA DE ESPAÑA Y DE JAPÓN

J. Chen Qin^{1,2}, M. Sánchez Sánchez^{1,2}, E. Viñas Esmel¹, M. Costafreda Mas¹, T. Komori³, K. Kario³ y M. Camafort Babkowski¹

¹Servicio de Medicina Interna. Hospital Clínic. Universidad de Barcelona. Barcelona. ²CAPSBE. Barcelona.



³Servicio de Cardiología. Jichi Medical University Hospital. Shimotsuke. Tochigi. Japón.

Resumen

Objetivos: La insuficiencia cardíaca es un importante problema de salud pública y una de las principales causas de hospitalizaciones y muerte. Ya que la IC aumenta con la edad, es un problema de salud cada vez más preocupante en países con mayor esperanza de vida como Japón y España. Dado que la influencia del control de la PAS en el paciente ambulatorio no está claro, nos proponemos evaluar en una cohorte multinacional esta variable.

Métodos: Estudio retrospectivo de pacientes con IC, mayores de 80 años, seguidos en consulta externa tras una hospitalización por IC, en Hospitales Docentes de Japón y España. Los datos se obtuvieron de historias clínicas electrónicas previa autorización del Comité de Ética.

Resultados: Se incluyeron 262 pacientes. 102 en Tochigi, y 162 en Barcelona. Se tomo como punto de corte la PAS medida en consulta en primera visita de 140 mm Hg. En pacientes diabéticos era más frecuente la PAS elevada (≥ 140 mm Hg) 35%, que en no diabéticos 21% (p 0,012). Asimismo, la HbA1c media era mayor en pacientes con PAS elevada Hb A1c% 6,744 vs. en pacientes con PAS normal 6,079 (p 0,001). Un 36% de los pacientes con PAS normal y un 37,5% de los pacientes con PAS elevada fueron éxitos siendo la diferencia no significativa. También analizamos las diferencias de mortalidad entre aquellos con PAS baja, PAS normal y PAS alta. La curva de Kaplan-Meier mostró una tendencia no significativa a una mayor mortalidad en aquellos con menor PA.



Conclusiones: En nuestro estudio no hemos observado diferencias en la mortalidad entre aquellos pacientes con PA con buen control frente aquellos con mal control. Aunque puede existir un sesgo de selección y este es un estudio retrospectivo, se necesitan más estudios que valoren la influencia de los controles de PA en la evolución de la IC en pacientes octogenarios.