

## Revista Clínica Española



https://www.revclinesp.es

## 1056 - EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRADA CENTRADA EN EL PACIENTE CON REINGRESOS HOSPITALARIOS FRECUENTES Y MULTIMORBILIDAD

**A. Suárez Piñera**, B. García Trincado, E. Rodríguez Ameijeiras, R.D. Martínez Casás y J.C. Piñeiro Fernández

Hospital Universitario Lucus Augusti. Lugo.

## Resumen


*Objetivos:* Conocer las características clínicas de los pacientes multiingresadores con multimorbilidad y evaluar la implantación de un programa de atención integral hospitalaria para reducir sus reingresos.

Métodos: Estudio prospectivo de cohortes de todos los pacientes incluidos en el programa de asistencia compartida de multiingresadores (3 o más ingresos) del Hospital de Día (HDD) de Medicina Interna del HULA, entre el 1/4/2019-30/4/2021. A través de un sistema hospitalario de altas prestaciones (HDD) y un equipo único multidisciplinar para simplificar la asistencia, se realizó a todos los pacientes una valoración integral multidimensional, un plan de cuidados personalizado con intervenciones múltiples y un seguimiento proactivo con acceso a demanda, incluyendo elementos esenciales como la Enfermería Gestora de casos o la telemedicina. Se realizó una revisión exhaustiva de la historia clínica y se analizaron las variables clínicas, demográficas y la frecuentación del sistema sanitario, a los 6 y 12 meses antes y después de la inclusión en el programa. Se realizó un análisis descriptivo y de supervivencia con el programa SPSS 22.0.

Resultados: Se incluyeron 161 pacientes, el 50,3% mujeres. Se caracterizaron por tener multimorbilidad [10,2 (3) enfermedades crónicas], edad avanzada [81,4 (11) años], polifarmacia [10,6 (3,5) fármacos], alto consumo de recursos sanitarios (elevada frecuentación del sistema hospitalario) y complejidad, medida por los índices pronósticos [Índice Profund: 8 (4,3)]. Los varones tenían significativamente más abuso de alcohol y tabaco, arteriopatía periférica y alteraciones visuales; las mujeres tenían más HTA, obesidad, enfermedad tiroidea, trastornos psiquiátricos y enfermedad osteoarticular. La mayoría fueron incluidos por ICC (61,5%) en exclusiva (más frecuente en mujeres) o solapada con EPOC (más frecuente en varones). Se apreció una reducción significativa de los ingresos y las asistencias a urgencias una vez fueron incluidos en el programa (p = 0,0001). Fallecieron el 44,7% en el primer año de seguimiento, el 51,4% en su domicilio. El Índice Profund a la inclusión fue un buen predictor del pronóstico (p = 0,043) y valores altos (riesgo intermedio-alto y alto) se asociaron con la mortalidad (RR 1,49; p = 0,004).

Edad	82 (10,5)	81 (11,5)	81,4 (11) Mediana = 84	0,515
Sovo Mujer	35 (43,2%)	46 (56,8%)	81 (50,3%	0.600
Sexo Varón	37 (46,3%)	43 (53,7%)	80 (49,7%)	0,698
Nº enfermedades crónicas	10,1 (3)	10,4 (3,3)	10,2 (3)	0,472
Nº fármacos	10,8 (3,8)	10,4 (3,2)	10,6 (3,5)	0,476
Polifarmacia (> 5 fármacos)	69 (44,2%)	87/55,8%)	156 (96,9%)	0,485
Índice PROFUND	9,3 (4,2)	7,1 (4)	8 (4,3)	0,001
Riesgo bajo (0-2 puntos)	4 (33,3%)	8 (66,7%)	12 (7,5%)	
Riesgo bajo-intermedio (3-6 puntos)	18 (34,6%)	34 (65,4%)	52 (32,3%)	0.015
Riesgo intermedio-alto (7-10 puntos)	23 (41,1%)	33 (58,9%)	56 (34,8%)	0,015
Riesgo alto (≥ 11 puntos)	27 (65,9%)	14 (34,1%)	41 (25,5%)	
Índice PALIAR	6,3 (3)	5,1 (3,6)	5,6 (3,4)	0,021
Riesgo bajo (0 puntos)	4 (17,4%)	19 (82,6%)	23 (14,3%)	
Riesgo intermedio (3-3,5 puntos)	13 (43,3%)	17 (56,7%)	30 (18,6%)	0.022
Riesgo alto (4-7 puntos)	31 (49,2%)	32 (50,8%)	63 (39,1%)	0,032
Riesgo alto-muy alto (7,5-21 puntos)	24 (53,3%)	21 (23,6%)	45 (28%)	
Índice de Barthel	49,4 (35,8)	61,5 (34,2)	56,4 (35,3)	0,045
Independiente (95-100 puntos)	9 (36%)	16 (64%)	25 (17,4%)	
Dependiente leve (60-95 puntos)	20 (36,4%)	35 (63,6%)	55 (38,2%)	
Dependiente moderado (40-59)	8 (38,1%)	13 (61,9%)	21 (14,6%)	0,306
Dependencia grave (20-39)	8 (61,5%)	5 (38,5%)	13 (9%)	
Dependencia total (0-19)	16 (53,3%)	14 (46,7%)	30 (20,8%)	
Índice de Charlson	6,7 (3)	6,8 (3,1)	6,8 (3) (1-20)	0,878
Comorbilidad (índice de Charlson > 3)	63 (46%)	74 (54%)	137 (85,1%)	0,441
Cuestionario de Pfeiffer	2,5 (3,2)	1,5 (2,1)	1,9 (2,6)	0,060
Escala de Lawton-Brody	1,8 (2,8)	3,1 (3,2)	2,6 (3,1)	0,033
Soporte social	63 (45,7%)	75 (54,3%)	138 (89,6%)	0,535
Riesgo social (Escala de Gijón)	14 (42,4%)	19 (57,6%)	33 (21,4%)	0,756
Enfermedades crónicas				
Tabaquismo	28 (46,7%)	32 (53,3%)	60 (37,3%)	0,702
Abuso de alcohol	14 (33,3%)	28 (66,7%)	42 (26,1%)	0,084
Hipertensión	58 (46%)	68 (54%)	126 (78,3%)	0,525
Diabetes	32 (51,6%)	30 (48,4%)	62 (38,5%)	0,164
Dislipemia	33 (45,8%)	39 (54,2%)	72 (44,7%)	0,798
Obesidad	13 (18,1%)	28 (68,3%)	41 (25,5%)	0,052
Fibrilación auricular	37 (42%)	51 (58%)	88 (54,7%)	0,454
Cardiopatía isquémica	18 (35,3%)	33 (64,7%)	51 (31,7%)	0,101
Valvulopatías	23 (45,1%)	28 (54,9%)	51 (31,7%)	0,948
Insuficiencia cardíaca	54 (44,6%)	67 (55,4%)	121 (75,2%)	0,967
EPOC	33 (47,1%)	37 (52,9%)	70 (43,5%)	0,588
Insuficiencia respiratoria crónica	21 (44,7%)	26 (55,3%)	47 (29,2%)	0,995
Ictus	15 (45,5%)	18 (54,5%)	33 (20,5%)	0,924
Enfermedad renal crónica	38 (45,8%)	45 (54,2%)	83 (51,6%)	0,780

Arteriopatía periférica		15 (51,7%)	14 (48,3%)	29 (18%)	0,402
Enfermedad tiroidea		11 (44%)	14 (56%)	25 (15,5%)	0,937
Neoplasia activa (sólida o hematológica)		17 (54,8%)	14 (45,2%)	31 (19,3%)	0,207
Anemia crónica (hemoglobina < 10 mg/dL)		31 (44,9%)	38 (55,1%)	69 (42,9%)	0,964
Demencia		25 (49%)	26 (51%)	51 (31,7%)	0,455
Trastorno psiquiátrico		19 (37,3%)	32 (62,7%)	51 (31,7%)	0,195
Alteraciones visuales		31 (43,1%)	41 (56,9%)	72 (44,7%)	0,702
Hipoacusia		25 (40,3%)	37 (59,7%)	62 (38,5%)	0,374
Incontinencia urinaria		40 (48,2%)	43 (51,8%)	83 (51,6%)	0,361
Enf osteoarticular crónica		26 (41,9%)	36 (58,1%)	62 (38,5%)	0,574
Tipo de asistencia	Tiempo de	Todos	Vivos [76 pacientes	Fallecidos [67 pacientes	p
Tipo de asistencia	seguimiento	(143 pacientes)	(53,1%)]	(46,9%)]	Р
Visitas a Urgencias hospitalarias	6 meses antes de la inclusión	3,1 (2)	3 (1,5)	3,4 (2,4)	0,0001
	6 meses después de la inclusión	1 (1,2)	0,8 (1,1)	1,2 (1,4)	
	12 meses antes de la inclusión	4,6 (2,7)	4,5 (2,4)	4,7 (3)	0,0001
	12 meses después de la inclusión	1,4 (1,6)	1,3 (1,6)	1,5 (1,7)	
Ingresos hospitalarios	6 meses antes de la inclusión	2,4 (1,4)	2,2 (1,1)	2,7 (1,8)	0,0001
	6 meses después de la inclusión	0,8 (1,1)	0,5 (0,8)	1,2 (1,3)	
	12 meses antes de la inclusión	3,4 (1,7)	3,1 (1,2)	3,6 (2,2)	0,0001
	12 meses después de la inclusión	1,1 (1,5)	0,8 (1,4)	1,4 (1,5)	



Discusión: Los ingresos múltiples definen a pacientes complejos, con multimorbilidad, elevada mortalidad y alto consumo de recursos, además, por las características demográficas de nuestra población, cada vez son más ancianos. El manejo de este subgrupo de pacientes sigue suponiendo un reto que ha puesto de manifiesto la necesidad de implantar nuevos modelos asistenciales que permitan optimizar el manejo de sus enfermedades crónicas. La identificación precoz en base a sus características clínicas, la creación de sistemas alternativos a la hospitalización y una valoración integral que incluya escalas pronósticas validadas, permite establecer planes de cuidados individualizados que favorecen una reducción de los reingresos y, probablemente, una mejoría de su calidad de vida.

Conclusiones: Este estudio muestra que los pacientes multiingresadores son muy complejos, tienen grandes necesidades asistenciales y requieren una atención diferenciada, adaptada a sus necesidades y al grado de evolución de sus enfermedades crónicas. Además, muestra que la implantación de un programa de atención integral de seguimiento proactivo, reduce los reingresos y permite tomar decisiones personalizadas.