



## 1400 - PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS

N. Carracedo Falagán, M. Vázquez del Campo, E. Magaz García, M.P. Díez Mateos, A.R. Álvarez Pérez y A. Morán Blanco

Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE). León.

### Resumen

**Objetivos:** Establecer la prevalencia de la enfermedad renal crónica (ERC) en un grupo definido de pacientes pluripatológicos.

**Métodos:** Se revisan los pacientes derivados a la Unidad de Continuidad Asistencial y que pertenecen a dos Centros de Salud del Área Sanitaria de León (enero de 2014 y diciembre de 2017). Se usó el programa estadístico SPSS v 20 para Mac.

**Resultados:** Son 76 pacientes con algún grado de enfermedad renal crónica de un total de 170 (45%). La edad media es de  $84 \pm 15$  frente a los  $79 \pm 20$  años de los que tienen la función renal normal (IC 1,8 a 7,4;  $p < 0,001$ ). El 52% (89) son hombres. La prevalencia de ERC grave (estadios IV y V) es del 10% en el total de la muestra, no hay diferencias por edad ni sexo. El índice de Charlson modificado es 8,6 para las formas moderadas frente al 9 en las graves (IC95% 0,7 a 1,5;  $p < 0,4$ ). Analizando las comorbilidades por separado tampoco encontramos diferencias entre los grupos. La situación funcional es algo mejor en las formas severas pero sin diferencias (índice Barthel 67 vs. 71;  $p < 0,5$ ). Tampoco unos toman más fármacos que los otros (10 vs. 11;  $p < 0,2$ ).

Estadio	Hombres	Mujeres	P
IIIA	19	19	0,4
IIIB	10	11	0,4
IV	8	6	0,4
V	0	3	0,4

*Conclusiones:* La prevalencia de ERC en una muestra de pacientes pluripatológicos es del 45% y está influenciada por la edad. Las formas graves llegan al 10% sin observar ninguna relación con factores a los que se asocian.