



## 1289 - IMPORTANCIA DEL INTERNISTA EN EL USO DE ANTI-TNF

**L.J. del Peral Rodríguez**, E. André Ruiz, J. Pedreira Bouzas, I. Ayala Larrañaga, A. Morales Ortega, M. Rivilla Jiménez, L. Rivas Prado y Á.R. Llerena Riofrío


Hospital Universitario de Fuenlabrada. Fuenlabrada. Madrid.

### Resumen

**Objetivos:** Realizar un análisis transversal del perfil de utilización en nuestro medio de los fármacos inhibidores selectivos del factor de necrosis tumoral (anti-TNF) que se encuentran disponibles actualmente, y extraer conclusiones sobre el rol del servicio de Medicina Interna en el uso de dichos tratamientos.

**Métodos:** Se recopilaron de forma anónima todos los pacientes con tratamiento activo con anti-TNF a fecha de 1 de junio de 2021 en nuestro centro y se recogió el diagnóstico principal, la dosis y el servicio prescriptor.

**Resultados:** Un total de 477 pacientes se encuentran actualmente en tratamiento con anti-TNF en nuestro centro. Teniendo en cuenta que atendemos una población de 219.415, esto supone una tasa del 2‰. El anti-TNF más utilizado es adalimumab (222) seguido de etanercept (92), infliximab (85), certolizumab (53) y por último golimumab (25). El diagnóstico más frecuente para el uso de anti-TNF es la enfermedad inflamatoria intestinal (117 Crohn, 32 colitis ulcerosa y 1 no clasificable) y la artritis reumatoide (115), seguido de la psoriasis con o sin artropatía asociada (91) y la espondilitis anquilosante (91). La aftosis con o sin diagnóstico de enfermedad de Behçet (10), hidradenitis supurativa (7), la uveítis (5), la artropatía juvenil (3) y otros diagnósticos (5) completan el total de indicaciones. El servicio con más prescripciones de anti-TNF es Reumatología (244) seguido de Digestivo (136), Dermatología (69), Pediatría (15) y Medicina Interna (13). El desglose del uso de cada anti-TNF por cada servicio concreto se encuentra reflejado en la figura. Medicina interna acumula la mayor tasa de indicaciones fuera de ficha técnica con la mitad de sus pacientes (6).



*Conclusiones:* Podemos observar que el servicio que acumula más prescripciones globalmente se trata de reumatología y digestivo, algo que no es de extrañar una vez comprobamos que las indicaciones más frecuentes de estos fármacos son la patología reumática y la enfermedad inflamatoria intestinal. Esto se debe a la importante prevalencia de estas patologías en nuestro medio. Sin embargo, medicina interna cumple un rol minoritario pero esencial, al encargarse del tratamiento de pacientes con uveítis y otras indicaciones fuera de ficha técnica, principalmente la enfermedad de Behçet pero también otras enfermedades minoritarias en las que los anti-TNF se utilizan bajo la evidencia de la que disponemos, pero que por su baja prevalencia e interés comercial, no tienen ensayos específicos controlados y aleatorizados que respalden la inclusión de la indicación en ficha técnica.