



1856 - IMPLICACIÓN PRONÓSTICA DE LOS NEUTRÓFILOS EN LA INFECCIÓN POR SARS-CoV-2

Patricia Pérez Guerrero¹, Francisco Illanes Álvarez², Denisse Márquez Ruiz², Cristina Rodríguez Fernández-Viagas¹, Sara Cuesta Sancho², Irene Campaña Gómez², Mercedes Márquez Coello³ y José Antonio Girón González³

¹Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz. ²INiBICA, Cádiz. ³Universidad de Cádiz, Cádiz.

Resumen

Objetivos: Los polimorfonucleares neutrófilos (PMN) suponen la mayoría de las células infiltrantes en el pulmón de enfermos con neumonía COVID-19. Adicionalmente, la relación PMN/linfocitos (RPL) es un parámetro pronóstico de la COVID-19. La actuación de los PMN puede ocurrir a través de la formación de NET (trampas extracelulares de PMN), conglomerados con capacidad para englobar gérmenes, plaquetas, etc., y favorecer alteraciones de la microcirculación. Su eliminación ocurre debido a la enzima DNasa I. **Objetivo:** analizar la implicación de NET en enfermos con neumonía COVID-19 y la valoración evolutiva de las mismas.

Métodos: Muestra de 81 enfermos con neumonía COVID-19 y 35 controles sanos, de similares edad y sexo. Valoración de parámetros pronósticos en el momento del ingreso (escalas CALLS-CORE y NEWS2, SatO₂/FiO₂, RPL, concentraciones séricas de proteína C reactiva -PCR- y ferritina). Determinación (basal, al alta y tras 14 días del alta) mediante citometría de flujo de PMN formadores de NETS; de mieloperoxidasa (MPO), enzima derivada de PMN, y de DNasa I, ambas mediante ELISA. Variable dependiente: muerte o ingreso en UCI. Resultados expresados como mediana (intervalo intercuartiles). Análisis de diferencias entre enfermos y controles (ji al cuadrado, U Mann Whitney); comparación en distintos momentos evolutivos (Friedman).

Resultados: Existió un incremento significativo en el momento basal de la RPL y de la proporción de NETS en sujetos con COVID-19 (tabla 1). Cinco enfermos fallecieron o ingresaron en UCI (6,2%). La puntuación NEWS2 y la relación SatO₂/FiO₂ fueron significativamente diferentes respecto a supervivientes (tabla 2). La evolución de los parámetros relativos a los PMNs se presenta en la tabla 3.

Tabla 1

Variable	Controles sanos (n = 35)	Enfermos con neumonía COVID-19 (n = 81)	p
RPL	198 (155-240)	483 (302-680)	< 0,001
NETS (% de PMN)	11 (4-29)	75 (64-88)	< 0,001
Mieloperoxidasa (ng/mL)	667 (479-1.225)	869 (500-1.500)	NS

DNasa I (ng/mL)	9 (5-13)	6 (3-12)	NS
-----------------	----------	----------	----

Tabla 2

Variable	Supervivientes (n = 76)	Fallecidos (n = 5)	p
Edad (años)	56 (46-68)	62 (49-70)	NS
Sexo varón (n, %)	49 (65)	3 (60)	NS
Escala NEWS2	2 (1-5)	7 (5-8)	0,002
Escala CALL-SCORE	9 (7-10)	11 (8-13)	NS
SatO2/FiO2	450 (417-467)	405 (299-424)	0,024
PCR (mg/L)	84 (36-141)	88 (22-192)	NS
Ferritina (ng/mL)	497 (317-1.051)	626 (358-12.730)	NS
RPL	479 (296-658)	503 (463-1.321)	NS
NET (% de PMN)	76 (65-88)	69 (33-89)	NS

Tabla 3

Variable	Basal	Alta	14 días tras alta	p
NETS (% de PMN)	76 (65-88)	25 (12-50)	17 (9-35)	< 0,001
Mieloperoxidasa (ng/mL)	869 (500-1.500)	605 (456-1.475)	340 (258-500)	< 0,001
DNasa I (ng/mL)	7 (3-13)	23 (11-33)	14 (7-25)	< 0,001

Conclusiones: La formación de NET, pero no de enzimas derivadas de PMN, está incrementada en individuos con neumonía COVID-19. Su proporción disminuye en supervivientes, inversamente al de la concentración de DNasa I. Estos datos apoyan la implicación patogénica de los PMN, aunque no su relación con pronóstico, en la neumonía COVID-19.