



<https://www.revclinesp.es>

1295 - SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES INFECTADOS POR SARS-COV-2 EN LA ERA PREVACUNACIÓN VS. POSVACUNACIÓN EN NUESTRO CENTRO

Sonia Córdoba Bueno, Juan Gómez Porro, Francisco Torres Partido, Inmaculada Cimadevilla Fernández, Santiago Tolosa Álvarez, Juan Diego Gallardo Sánchez, Luis García Martínez y Gema María García García

Hospital Universitario de Badajoz, Badajoz.

Resumen


Objetivos: Conocer si los pacientes con COVID de la era prevacunación, con respecto al era posvacunación, tienen mejor pronóstico, relacionado con una menor activación de sus marcadores inflamatorios.

Métodos: Estudio descriptivo de cohortes retrospectivo, correspondiente a los pacientes del registro SEMI COVID, reclutados en nuestro centro. Se han establecido dos cohortes de pacientes, a partir de la fecha de corte del 1 de junio de 2021. Se analizan las diferencias entre esos grupos relacionadas con los antecedentes clínicos y los parámetros analíticos más relevantes. Para profundizar en las variables relacionadas con la inflamación se utilizan índices previamente validados: CAR: ratio proteína C reactiva/albúmina. HALP: (hemoglobina × albúmina × linfocitos)/plaquetas. LCR: índice linfocito/PCR. NLR: índice neutrófilo/linfocito. PLR: índice plaquetas/linfocitos. Por último se realiza una curva de supervivencia Kaplan Meier, en relación a la mortalidad intrahospitalaria y una regresión de Poisson para evaluar las variables asociadas al mal pronóstico.

Resultados: Se incluyeron 661 pacientes (edad media 71 años, 355 varones y 306 mujeres), siendo 544 de ellos de la era prevacunación (grupo 1) y 117 de la posvacunación (grupo 2). Los pacientes ingresados durante la era posvacunación fueron significativamente más jóvenes. En general, el grado de inflamación en este segundo grupo fue menor, especialmente significativo en el caso de la PCR y de los ratios LCR y CAR. En cuanto a la supervivencia, el grupo 2 parece presentar mejor pronóstico sin alcanzar significación estadística (fig. 2).

Variables	Grupo 1	Grupo 2	P
N	544	117	
Sexo (mujer)	256 (45.9)	50 (42.7)	0.54
Diabetes mellitus	168 (30.9)	28 (23.9)	0.14
Hipertensión arterial	336 (61.71)	62 (52.9)	0.09
Dislipemia	254 (46.7)	43 (36.7)	0.052
Fibrilación auricular	86 (15.81)	23 (19.6)	0.33
Obesidad	17 (3.12)	7 (5.9)	0.16
Insuficiencia cardiaca descompensada	40 (7.3)	8 (6.8)	1
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	25 (4.6)	4 (3.4)	0.8
Ictus	23 (4.2)	3 (2.6)	0.59
Enfermedad renal	57 (10.5)	9 (7.7)	0.49
Neoplasia	41 (7.5)	8 (6.8)	1
Conectivopatía	20 (3.7)	4 (3.4)	1
Edad (años)	74.7 (22.8)	66.5 (37)	0.02
Creatinina (mg/dL)	0.99 (0.52)	1 (0.51)	0.2
Glucosa (mg/dL)	124 (48.2)	119 (36)	0.07
PCR (mg/L)	79 (106.5)	55.8 (89.4)	0.01
PAS (mmHg)	127 (29.2)	122 (30)	0.01
PAD (mmHg)	74 (18)	75 (20)	0.67
Frecuencia cardiaca (lpm)	80 (21)	79 (20)	0.11
Temperatura (°C)	36.5 (1.2)	36.5 (1)	0.09
PAFI (mmHg)	290.7 (71.4)	309.5 (73.3)	0.0007
Ferritina (ng/ml)	494 (1026)	446 (933)	0.97
IL-6	22.6 (53)	45.5 (57)	0.06
Fibrinógeno (mg/dL)	687 (245.5)	713 (203)	0.13
Dimero D (ng/ml)	890.5 (1062.2)	659 (609.5)	0.0003
NLR	5.2 (5.9)	4.7 (6)	0.25
LCR	13.2 (26.5)	178 (64.3)	0.03
PLR	192.4 (145.8)	177.8 (142.1)	0.25
CAR	20.9 (30.6)	15.6 (26.8)	0.03
HALP	0.25 (0.21)	0.28 (0.31)	0.13
Albúmina (g/dl)	3.6 (0.7)	3.6 (0.7)	0.97
Remdesivir	125 (22.9)	20 (17.1)	0.17
Tocilizumab	45 (8.3)	20 (17.1)	0.005

CAR: ratio proteína C reactiva/Albúmina. HALP: (Hemoglobina x Albúmina x Linfocitos)/Plaquetas. LCR: índice linfocito/PCR. NLR: índice neutrófilo/linfocito. PAD: presión arterial diastólica. PAFI: Presión arterial x Flujo Inspiratorio. PAS: presión arterial sistólica. PCR: proteína C reactiva. PLR: índice plaquetas/linfocitos.



Discusión: Los pacientes del segundo grupo, fueron más jóvenes (posiblemente por el efecto de la vacunación sobre la población mayor, que ingresó menos en ese momento). Igualmente es posible que en los pacientes ingresados la vacunación ejerciese un efecto modulador de la respuesta inflamatoria de los pacientes que tuvo repercusión en el pronóstico de este grupo.

Conclusiones: Los pacientes de la era posvacunación son más jóvenes. Los parámetros inflamatorios son menores en la era posvacunación. La supervivencia es mayor en la era posvacunación. Se precisan estudios con mayor número de pacientes en la era posvacunación para estudiar la supervivencia.