



405 - SEDACIÓN PALIATIVA EN PACIENTES FALLECIDOS EN PLANTA DE MEDICINA INTERNA

Alberto Cáceres Gestoso, Alfredo Luis Díaz Gómez y Jesús Ildefonso Soto Benítez

¹Hospital del SAS San Carlos, San Fernando (Cádiz).

Resumen

Objetivos: Describir las características de los pacientes fallecidos en nuestra unidad durante el año 2020, así como la necesidad de utilización de sedación paliativa para los últimos momentos.

Métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo. Se revisaron las historias clínicas de los pacientes fallecidos en nuestra unidad entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020. Se registraron las características demográficas, la necesidad de sedación paliativa y el tiempo transcurrido entre el inicio de sedación y el fallecimiento del paciente.

Resultados: Se incluyeron 353 pacientes con una edad media de $81,32 \pm 10,83$ años, de los que el 46,7% eran hombres. Un 26,1% de los pacientes se encontraba institucionalizado en una residencia sociosanitaria. El 66% de los pacientes tenía un grado de dependencia al menos moderado (índice de Barthel). 234 pacientes (66,3%) requirieron sedación paliativa. El 22,7% de los pacientes tenía diagnosticada patología oncológica, siendo el más frecuente el cáncer de pulmón (22% de los pacientes). La perfusión de sedación más utilizada constaba de midazolam, morfina y escopolamina (47% de los pacientes). El 95% de los pacientes sedados (223) presentó un adecuado control de síntomas con la sedación.

Conclusiones: Los enfermos fallecidos en nuestro centro tienen una edad media avanzada y un elevado grado de dependencia. El 66% de los pacientes requirieron sedación paliativa, siendo esta adecuada para el control de síntomas en casi el 100% de los fallecidos.