



Revista Clínica Española



<https://www.revclinesp.es>

226 - VACUNAS EN PERSONAL SANITARIO: APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES

Ana María Alonso Robles, María de los Ángeles Galindo Andúgar, Antonio Jesús Cantillo Berni, Isabel Ríos Santiago, Juan Javier Albendea Bascón, Luis Alonso González Sánchez, Antonio Manuel Martín Castillo y Miguel García Sánchez-Manjavacas

Hospital General La Mancha Centro, Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Resumen

Objetivos: Analizar las principales dudas del personal sanitario para vacunarse de la gripe y del COVID-19.

Métodos: Estudio descriptivo realizado en mayo 2022. Los datos se recogieron mediante encuestas anónimas entre el personal del Hospital La Mancha Centro (HGLMC), y electrónicas (Google forms) en el personal de enfermería del Hospital Universitario Reina Sofía (HURS).

Resultados: Se obtuvieron 173 encuestas, 123 en el HGLMC y 50 en el HURS, con mayor número de mujeres (64%). La distribución por edad fue: 70 eran 45 (28%). Por experiencia un 37% tenían 10 años. La categoría profesional fue: médicos 52 (30%) siendo residentes 23 (13%), graduado en enfermería (DUE) 91 (52%), técnico cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) 26 (15%), y 4 celadores (2%). Se vacunaron de COVID-19 en 2020-2021 un total 162 (94%). 3 no pudieron vacunarse, y 8 no quisieron. 120 profesionales buscaron información sobre la vacuna; entre los médicos adjuntos el sitio más habitual fueron las revistas científicas; entre los residentes y los DUE fueron, los compañeros y las revistas por igual; entre los TCAE se añade además la televisión, y entre los celadores lo más importante fue los compañeros de trabajo. Sobre las dudas de la vacunación COVID-19, la principal fue el miedo a los efectos secundarios. La siguiente fue la desinformación, siendo esta más frecuente entre DUE, TCAE y celadores. Con respecto a la intención de vacunarse en la próxima campaña, en general los porcentajes son menores, especialmente en DUE y TCAE (en los que bajan a 78% y 61% respectivamente). En cuanto a la administración conjunta de la vacuna COVID-19 y antigripal en 2021, 43 personas (25%) que no se vacunaban de la gripe cambiaron de opinión y lo harán más a partir de ahora. Hubo 10 profesionales que tenían dudas sobre la administración combinada, de ellos 8 no se vacunaban en años previos y su opinión no se modificó, y 2 se las pusieron a pesar de ello. Las principales razones para no vacunarse de la gripe fueron no considerarlo necesario y el miedo a los efectos secundarios.

Conclusiones: El miedo a los efectos secundarios es la principal razón para dudar sobre las vacunas. La administración conjunta de la vacuna gripal y el COVID-19 aumentó el número de profesionales sanitarios dispuestos a vacunarse en años siguientes.