



## 398 - TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA DISTAL VS. PROXIMAL: CARACTERÍSTICAS, FACTORES DE RIESGO Y EVOLUCIÓN

**Marina López Rubio<sup>1</sup>**, Marta Olimpia Lago Rodríguez<sup>1</sup>, David Casasola González<sup>1</sup>, Rubén Alonso Beato<sup>1</sup>, Crhistian Mario Oblitas<sup>1,2</sup>, Sergio Moragón Ledesma<sup>1,2</sup>, Pablo Demelo Rodríguez<sup>1,2</sup> y Lucía Ordieres Ortega<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España. <sup>2</sup>Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón (IiSGM), Madrid, España.

### Resumen

**Objetivos:** Comparar las características basales, forma de presentación y evolución de los pacientes con trombosis venosa profunda (TVP) distal frente a aquellos con TVP proximal.

**Métodos:** Estudio observacional prospectivo sobre pacientes diagnosticados de TVP en miembros inferiores en un hospital de tercer nivel, desde marzo 2001 hasta mayo 2023, comparando sus características en función de la localización del trombo distal o proximal al hueso poplíteo. Utilizamos el test  $\chi^2$  para comparación de variables cualitativas y t de Student para las cuantitativas, estableciendo la hipótesis nula de concordancia y aceptando como significativo un valor  $p < 0,05$ .

**Resultados:** Estudiamos 2.029 pacientes con TVP en miembros inferiores, de los cuales 354 presentaron TVP distal al hueso poplíteo y 1675 TVP proximal (incluyendo en este grupo a los pacientes con afectación de la vena poplíteo). Los resultados se muestran en las tablas. Los pacientes con TVP proximal eran mayores (64,1 vs. 61,1 años,  $p = 0,002$ ), y tenían con más frecuencia antecedente de hipertensión, sin diferencias en el resto de las características basales. En el seguimiento, no hubo diferencias en la frecuencia de recurrencia, hemorragia o mortalidad.

**Discusión:** En cuanto a factores de riesgo para enfermedad tromboembólica venosa (ETV), la presencia de cáncer era más frecuente en pacientes con TVP proximal, así como el antecedente de ETV. Por el contrario, la realización de un viaje prolongado, la inmovilización reciente, o la infección por SARS-CoV-2, fueron más frecuentes en los pacientes con TVP distal. Las dos últimas podrían relacionarse con que estos pacientes estaban más frecuentemente ingresados en el momento del diagnóstico. Los pacientes con TVP proximal presentaron con mayor frecuencia tumefacción, taquicardia y el dímero D positivo, con mayor elevación del Nt-proBNP. Además, requirieron ingreso con mayor frecuencia. Todas estas diferencias podrían deberse a la menor carga trombótica y, por tanto, generalmente menor gravedad de la ETV en pacientes con TVP distal. Sin embargo, llama la atención la ausencia de diferencias en la frecuencia de tromboembolismo pulmonar (TEP). No hubo diferencias en cuanto al fallecimiento, recurrencia de ETV o el desarrollo de hemorragias. La valoración de la presencia de síndrome posttrombótico (SPT) a los 12 meses del diagnóstico se realizó más en pacientes con TVP proximal, que presentaron más dolor, pesadez, prurito, edema, hiperpigmentación y circulación colateral que los pacientes con TVP distal.

	TVP distal (N=354)	TVP proximal (N=1675)	Valor p
Sexo (masculino)	57,06%	53,73%	0,253
<b>Edad</b>	<b>61,16 +/- 16,76</b>	<b>64,19 +/- 17,49</b>	<b>0,002</b>
<b>Ambulatorio</b>	<b>80,23%</b>	<b>91,82%</b>	<b>&lt;0,001</b>
IAM	5,08%	3,88%	0,299
Ictus	6,78%	4,78%	0,12
Arteriopatía periférica	1,98%	2,75%	0,41
Fumador	15,82%	16,96%	0,603
Diabetes Mellitus	11,30%	13,07%	0,363
<b>HTA</b>	<b>36,44%</b>	<b>43,88%</b>	<b>0,01</b>
Insuficiencia cardiaca	3,39%	4,42%	0,383
Fibrilación auricular	1,69%	2,27%	0,501
Dislipemia	27,40%	24,54%	0,258
Enfermedad pulmonar crónica	11,02%	10,27%	0,675
EII	0,28%	0,96%	0,207
Trombofilia conocida	0,56%	2,03%	0,058
<b>Cáncer</b>	<b>12,71%</b>	<b>18,57%</b>	<b>0,008</b>
Cirugía reciente (2 meses)	12,15%	8,96%	0,063
<b>Inmovilización &gt; 4 días</b>	<b>34,46%</b>	<b>22,57%</b>	<b>&lt;0,001</b>
<b>Antecedente ETV</b>	<b>5,93%</b>	<b>15,04%</b>	<b>&lt;0,001</b>
Historia familiar ETV	8,76%	6,21%	0,08
<b>Viaje &gt; 6 horas</b>	<b>8,19%</b>	<b>2,27%</b>	<b>&lt;0,001</b>
Tratamiento hormonal	6,50%	6,15%	0,805
Embarazadas	1,13%	1,01%	0,846
Puerperio	0,28%	0,42%	0,712
<b>Infección por SARS-CoV-2</b>	<b>21,75%</b>	<b>7,52%</b>	<b>&lt;0,001</b>

**Tabla1.** Comparación de características basales de pacientes con TVP distal frente a TVP proximal. TVP (trombosis venosa profunda), IAM (infarto agudo de miocardio), HTA (hipertensión arterial), EII (enfermedad inflamatoria intestinal), ETV (enfermedad tromboembólica venosa).

	TVP distal (N=354)	TVP proximal (N=1675)	Valor p
<b>FORMA DE PRESENTACIÓN</b>			
<b>Requirió ingreso</b>	<b>29,38%</b>	<b>54,39%</b>	<b>&lt;0,001</b>
Dolor de extremidad	77,97%	79,82%	0,432
<b>Tumefacción de extremidad</b>	<b>61,86%</b>	<b>85,01%</b>	<b>&lt;0,001</b>
<b>Afectación lado derecho</b>	<b>47,74%</b>	<b>41,25%</b>	<b>0,025</b>
TEP asociado	29,94%	25,97%	0,125
<b>FC <math>\geq</math> 100 lpm</b>	<b>15,82%</b>	<b>24,24%</b>	<b>0,001</b>
TA < 100 mmHg	4,24%	5,61%	0,297
SatO <sub>2</sub> < 90%	3,39%	2,81%	0,552
<b>Dímero D positivo</b>	<b>81,36%</b>	<b>85,85%</b>	<b>0,031</b>
AS Troponina elevada	5,65%	8,66%	0,06
<b>Nt-proBNP</b>	<b>1049,66 +/- 2563,33</b>	<b>1851,24 +/- 3982,54</b>	<b>&lt;0,001</b>
<b>EVOLUCIÓN</b>			
Muerte	6,50%	8,60%	0,192
Recurrencia ETV	8,19%	9,31%	0,505
Hemorragia	11,58%	11,52%	0,975
Hemorragia grave	5,08%	4,30%	0,514
<b>Valoración SPT a los 12 meses</b>	<b>15,54%</b>	<b>27,58%</b>	<b>&lt;0,001</b>
<b>Dolor</b>	<b>1,41%</b>	<b>4,30%</b>	<b>0,01</b>
<b>Pesadez</b>	<b>1,41%</b>	<b>5,01%</b>	<b>0,003</b>
<b>Prurito</b>	<b>0,28%</b>	<b>1,73%</b>	<b>0,04</b>
<b>Edema</b>	<b>2,54%</b>	<b>12,90%</b>	<b>&lt;0,001</b>
<b>Hiperpigmentación</b>	<b>0,85%</b>	<b>4,54%</b>	<b>0,001</b>
<b>Circulación colateral</b>	<b>1,13%</b>	<b>5,49%</b>	<b>&lt;0,001</b>
Eritema	0,85%	2,15%	0,105
Dolor en pantorrilla a la presión	0,28%	0,66%	0,404
Úlcera venosa	0,00%	0,48%	-
Calambres	1,13%	1,97%	0,283
Parestesias	1,41%	1,97%	0,482
Induración cutánea	0,28%	1,37%	0,085

**Tabla 2.** Comparación de forma de presentación y evolución de pacientes con TVP distal frente a TVP proximal. TVP (trombosis venosa profunda), TEP (tromboembolismo pulmonar), FC (frecuencia cardiaca), TA (tensión arterial), AS (análisis de sangre), ETV (enfermedad tromboembólica venosa), SPT (síndrome post-trombótico)

**Conclusiones:** En la muestra estudiada, los pacientes con TVP distal son más jóvenes y presentan más factores de riesgo transitorios como la inmovilización reciente, viajes prolongados o la infección por SARS-CoV-2, con menor frecuencia de cáncer y antecedentes de ETV. Requieren menos ingresos y presentan menos síntomas, sin embargo llama la atención la ausencia de diferencias en la frecuencia de TEP. En el seguimiento presentan menos signos y síntomas de SPT.