



## 1573 - ESTUDIO OBSERVACIONAL PROSPECTIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y SEROLÓGICAS EN PACIENTES CON SÍNDROME DE SJÖGREN DIAGNOSTICADOS ENTRE 2019 Y 2023

*Elena Gloria Torres García, Lucía Platero Dueñas, Raquel Sorriquieta Torre, Camilo Mendieta Rodríguez, Juan José Ríos Blanco, Elena Martínez Robles, Jorge Álvarez Troncoso y Clara Itziar Soto Abánades*



*Hospital La Paz, Madrid, España.*

### Resumen

**Objetivos:** Este estudio buscó caracterizar y diferenciar las presentaciones clínicas y serológicas en pacientes con síndrome de Sjögren seronegativo (SS-Ro-) y seropositivo (SS-Ro+), utilizando una evaluación multiparamétrica que incluyó el test de Schirmer, la medición del flujo salival, la detección de anti-Ro y la biopsia de glándulas salivares menores (BGSA).

**Métodos:** Estudio observacional prospectivo de pacientes diagnosticados de síndrome de Sjögren en una Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas entre 2019 y 2023. Se analizaron las características clínicas y serológicas de los pacientes.

**Resultados:** Se incluyeron 132 pacientes con SS (35 SS-Ro- y 97 SS-Ro+). Los pacientes con SS-Ro- demostraron una mayor frecuencia de BGSA+ (FS  $\geq$  1) (100%), diabetes (22,86%), VHC (5,71%), mielitis (5,71%) y sialoadenitis linfocítica focal (88,57%). Además, se observaron mayores proporciones de esclerodermia (11,43%) y patología neurológica (25,71%), aunque estas diferencias no alcanzaron la significación estadística. Los pacientes con SS-Ro+ mostraron una mayor prevalencia de ANA+ (96,91%), Anti-La+ (27,66%), C3 bajo (8,25%), C4 bajo (22,68%), IgG  $\geq$  1.600 (25,77%), IgA  $\geq$  300 (35,05%), factor reumatoide+ (40,70%) y dilatación ductal (54,22%). Se encontró también un porcentaje mayor de pacientes con hipoacusia neurosensorial (42,86%) y FS  $\geq$  3 (11,34%) en el grupo SS-Ro+, aunque estos resultados no fueron estadísticamente significativos.



**Conclusiones:** Nuestro estudio prospectivo multiparamétrico revela diferencias significativas en las manifestaciones clínicas y serológicas entre los pacientes con SS-Ro- y SS-Ro+. Se observaron diferencias porcentuales relevantes en algunas condiciones clínicas a pesar de no alcanzar significación estadística. Estos hallazgos pueden ayudar a mejorar la precisión diagnóstica y la estratificación terapéutica de los pacientes con síndrome de Sjögren.