



<https://www.revclinesp.es>

560 - PERFIL DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN PACIENTES INGRESADOS POR EVENTOS ISQUÉMICOS EN UN HOSPITAL COMARCAL

Alba M^a García Alabarce¹, Irene Gil Hernando¹, Antonio Torres Gómez² y Cristina María Abellán Muñoz¹

¹Hospital Básico General Santa Ana, Granada, España. ²Hospital San Agustín, Linares, España.

Resumen

Objetivos: El objetivo de nuestro estudio fue la valoración de los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) de los pacientes que ingresaron en nuestra unidad por un proceso isquémico, tanto cerebral como cardiaco.


Métodos: Consistió en un estudio observacional longitudinal prospectivo en una población de pacientes hospitalizados por cardiopatía isquémica o accidente cerebrovascular entre agosto de 2022 y mayo de 2023. Se registraron datos epidemiológicos: edad, sexo, índice de masa corporal (IMC); y FRCV diagnosticados y tratados al ingreso: hipertensión arterial (HTA); diabetes mellitus (DM), tabaquismo y perfil lipídico.

Resultados: Se recogió una muestra de 41 pacientes, de los cuales 28 (68,3%) fueron varones y 13 (31,7%) mujeres. El motivo de ingreso fue cardiopatía isquémica en 24 (58,5%) e ictus en 17 (41,5%). En la población con cardiopatía isquémica el 66,7% eran varones y el 33,3% mujeres. Entre ellos, el FRCV más frecuentes fue la HTA (58,3%). La media de IMC fue de $29,7 \pm 4,2$. El 70,9% tenía antecedentes de tabaquismo, siendo el 25% fumadores activos con un índice de consumo acumulado de tabaco (ICAT) medio de $27,9 \pm 22,6$ paq/año. El 29,2% presentaba diagnóstico de DM, cuya media de hemoglobina glicosilada (HbA1c) de los pacientes con tratamiento fue $6,3 \pm 1,1$; mientras que la de los que no fue $5,6 \pm 0,5$. Respecto al estudio de dislipemias, el 50% presentaban tratamiento previamente. Se pueden ver las medias del perfil lipídico en [TABLA 1]. En la población con ictus 70,6% eran varones y el 29,4% mujeres. En este caso, se encontraba con el mismo porcentaje la HTA como la dislipemia: 64,7%. Las medias del respecto al perfil lipídico se pueden ver en la [tabla 2]. La media de IMC fue de $29,9 \pm 4,7$. En esta población encontramos un 76,5% de antecedentes de tabaquismo, siendo el 41,2% fumadores activos con un ICAT medio de $32,3 \pm 20,6$ paq/año. El 29,4% presentaba diagnóstico de DM, cuya media de HbA1c de los pacientes con tratamiento fue $6,6 \pm 1,1$; mientras que la de los que no fue $5,4 \pm 0,3$.

Dislipemia	Colesterol total	HDL	LDL	Triglicéridos	Col No HDL	Índice colT/HDL	Índice TG/HDL
No Media	177,3	39,3	102,1	180,2	138,1	4,8	4,8

Desviación típica	38,6	13,1	31	143,3	35,7	1,2	3,5
Media	157,7	45,8	84,8	138,1		111,9	3,7
Sí							
Desviación típica	52,9	17,7	43,9	60,3		42,1	0,9
Media	167,5	42,5	93,4	159,1		125	4,3
Total							
Desviación típica	46,4	15,6	38,2	109,6		40,5	1,2
Dislipemia	Colesterol total	HDL	LDL	Triglicéridos	Col No HDL	Índice colT/HDL	Índice TG/HDL
Media	178,2	39,7	113,8	124	138,5	4,4	3,4
No							
Desviación típica	46,9	8,3	41,1	25,9	40,2	0,7	0,9
Media	152,9	38,9	83,1	197,5	113,1	3,9	5,2
Sí							
Desviación típica	54,6	8,2	41,1	133,1	49,8	0,9	3,2
Media	161,8	39,2	93,9	171,6	122,1	4,1	4,5
Total							
Desviación típica	51,9	7,9	42,6	112,2	46,9	0,8	2,7

B Objetivo terapéutico para el cLDL



Discusión: Los FRCV son aquellas características que predicen la aparición de enfermedades cardiovasculares, siendo estas de las primeras causas de mortalidad a nivel mundial. Los FRCV clásicos son la HTA la DM, las dislipemias, el tabaquismo y la obesidad; siendo las dislipemias el principal factor que influye en el proceso deletéreo de la formación de la placa de ateroma. Según las Guía ESC/EAS 2019 sobre el tratamiento de las dislipemias, los objetivos de control establecidos para el LDLc en función del riesgo cardiovascular (fig.).

Conclusiones: 1. En nuestra población, la HTA es el FRCV más común. 2. La DM presentaba por lo general un buen control. 3. Respecto al perfil lipídico en ambas poblaciones presentaba un control subóptimo pese a que un porcentaje de ellos ya tenía prescrita medicación para ello. 4. En la población de ictus había un mayor porcentaje de fumadores activos. 5. La media de IMC en ambas poblaciones se encontraba en el límite superior del rango de sobrepeso.

Bibliografía

1. Guía ESC/EAS 2019 sobre el tratamiento de las dislipemias: modificación de los lípidos para reducir el riesgo cardiovascular. Rev Española Cardiol [Internet]. Mayo de 2020 [consultado el 13 de junio de 2023];73(5):403.e1-403.e70. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.recesp.2019.10.031>