



879 - CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS PACIENTES INGRESADOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DURANTE EL AÑO 2022 CON DIAGNÓSTICO DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA EN UN CENTRO DE SEGUNDO NIVEL

Victoria Palomar Calvo, Francisco Josué Cordero Pérez, Pablo García Carbó, Andrea María Moreno González, Miguel Morán Sánchez, Mehamed Mohamed Mehamed, Pablo Rodríguez López, Luis Jiménez Jurado y Sara Pintos Otero


Complejo Asistencial de Zamora, Zamora, España.

Resumen

Objetivos: Nuestro objetivo fue describir las características clínicas, demográficas y terapéuticas de los pacientes con trombosis venosa profunda (TVP) ingresados nuestro servicio durante el año 2022.

Métodos: Se analizó una muestra de 10 pacientes con TVP tratados en nuestro servicio en 2022. Se recogieron datos demográficos, clínicos y de tratamiento, abarcando 15 variables.

Resultados: Se hallaron un total de 10 pacientes, con una media de edad de 80 años. La mitad eran mujeres. Dímero D con una media de 12,716. Solo 1 de los pacientes tenía antecedentes de ETEV y estaba anticoagulado previamente, así mismo 1 paciente con cáncer. En ningún caso se registró escala de probabilidad de Wells previo a diagnóstico. En cuanto a los factores de riesgo, solo un paciente tenía factor de riesgo fuerte, 3 tenían factores de riesgo moderado y el resto leves salvo 2 que no tenían ningún factor de riesgo (fig.). Ningún episodio de consideró claramente provocado al alta. En cuanto al tratamiento 5 pacientes seguían anticoagulados de manera indefinida al año del episodio, el resto osciló de 3 a 14 meses con una media de 6,2 meses. Ningún paciente recidivó al año y 2 sufrieron durante el seguimiento hemorragias (2 digestiva, 1 urinaria).



Conclusiones: Los pacientes que ingresan por TVP en medicina interna en nuestro centro son de edad avanzada y con igualdad de género. Ningún episodio de TVP fue considerado como provocado al alta, y solo un paciente tenía cáncer activo y otro antecedente de ETEV. Nuestra muestra es pequeña, si bien cabría revisar el criterio de ingreso de los pacientes con trombosis venosa profunda en nuestro centro dado que probablemente ocasionalmente sea así por cautela excesiva.