



1251 - ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS UVEÍTIS REMITIDAS A UNA UNIDAD MULTIDISCIPLINAR DE REFERENCIA

Daniel Ávila Royón, Jesús Antonio Cívico Ortega, Daniel de la Cueva Genovés, Elena Basallote Leal, Víctor Urbaneja Zumaquero, Ángela Eloisa Moliz Molina y Daniel Clavijo Guerrero

Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga, España.

Resumen

Objetivos: El objetivo del estudio es analizar y describir la clasificación anatómica y etiológica, las características clínicas y epidemiológicas y los síntomas más frecuentes de los casos de uveítis en nuestra población.

Métodos: Se analizaron retrospectivamente las historias clínicas de 55 pacientes que fueron evaluados y seguidos en una consulta multidisciplinar de inmunopatología ocular de referencia del sur de España, desde enero de 2018 hasta mayo de 2024.

Resultados: Se estudiaron 55 casos, en 35 mujeres y 20 hombres, con una media de edad al diagnóstico de $41,42 \pm 9,67$ años. Los síntomas más frecuentes fueron visión borrosa (71,22%), dolor ocular (62,32%) e hiperemia (54,43%). La clasificación anatómica más frecuente fue anterior (34,25%), seguida de panuveítis (28,08%), uveítis posterior (27,17) e intermedia (10,5%). En cuanto a la etiología, la mayoría de las uveítis fueron idiopáticas (45,83%), seguidas de las inmunomediadas (20,83%), los síndromes primariamente oculares (14,58%) y las mixtas (2,08%). Las causas infecciosas no fueron estudiadas por esta unidad.

Conclusiones: Los datos de nuestro estudio demuestran características similares con las uveítis de otras regiones de nuestro país y países occidentales. Las uveítis anteriores y las idiopáticas fueron las más frecuentes en nuestra serie.

Bibliografía

1. Andonegui J. Manifestaciones oculares de las enfermedades sistémicas. An Sis Sanit Navar. 2008;31(Supl. 3):7-11.
2. Krishna U, Ajanaku D, Denniston AK, Gkika T. Uveitis: A sight-threatening disease which can impact all systems. Postgrad Med J. 2017;93:766-73.
3. González Peña A, Mesa-Hernández E, Hernández-Pérez A, Tirado-Martínez OM, Ortega-Díaz L. Comportamiento clínico-epidemiológico de las uveítis anteriores. Rev Mex Oftalmol. 2013;87:208-14.
4. Llorenç Bellés V, Adán Civera A, Espinosa G, et al. Caracterización de las uveítis diagnosticadas

en un centro de referencia del área de Barcelona. *Med Clin (Barc)*. 2012;138:293-5.

5. Fonollosa A, Adán A. Uveítis: un abordaje multidisciplinar. *Arch Esp Oftalmol*. 2011;86:393-4.

6. Fanlo P, Heras H, Pérez D, Tiberio G, Espinosa G, Adan A. Profile of patients with uveitis referred to a multidisciplinary unit in northern Spain. *Arch Soc Esp Oftalmol*. 2017;92:202-9.