



1048 - CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIH INGRESADOS EN UN HOSPITAL TERCIARIO

Eva López-Urrutia Baquero, Marta Sanz Alba, Javier Pérez Serrano, Jesús Álvarez Rodríguez y Carmen Sáez Béjar

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid, España.

Resumen

Objetivos: Analizar las características sociodemográficas y clínicas de las personas que viven con VIH (PVVIH) que ingresan en un hospital terciario.

Métodos: Se incluyeron en el estudio todas las PVVIH ingresadas en un hospital terciario por cualquier motivo durante los años 2021 y 2022. Fueron excluidos aquellos pacientes ingresados de manera programada para procedimientos intervencionistas. Se recogieron variables demográficas (sexo, edad, país de origen) y clínicas (comorbilidades, consumo de sustancias, ingresos previos, datos de control inmunoviológico). Por último, se evaluó al año el cumplimiento del tratamiento y seguimiento, la mortalidad y la necesidad de reingreso.

Resultados: Ingresaron un total de 165 PVVIH, 83,6% hombres, con una mediana de edad de 54 años (RIC 44-60). El 68,5% eran originarios de España, y 25,4% de diferentes países de América Latina. Solo 7 pacientes (4%) se diagnosticaron en el mismo ingreso, y la mediana de años desde el diagnóstico de los restantes 158 pacientes fue de 19. La mayoría de los pacientes tenían buen control inmunoviológico previo (76% con carga viral < 50 copias/ml, mediana CD4 544/ml). El 11% de los pacientes no recibía tratamiento antirretroviral (TAR), 7 por ser de nuevo diagnóstico y 11 por abandono previo. El resto de resultados se recogen en la tabla. En el año tras el alta, el 83% tuvo buen cumplimiento del tratamiento y el 78% del seguimiento; 36% reingresaron y 10% fallecieron.

| Variable | n (%) |
|-----------------------------|----------------|
| Sexo masculino | 139/165 (84,2) |
| VIH conocido | 158/165 (95,8) |
| Inf. oportunistas previas | 38/162 (23,5) |
| CV > 50 | 39/164 (23,8%) |
| CD4 < 200 | 30/163 (18,4) |
| Abuso alcohol | 25/164 (15,2) |
| Fumador | 73/165 (44,2) |
| Otros consumos de drogas | 37/165 (22,4) |
| Enfermedad psiquiátrica | 26/165 (15,6) |
| Sin TAR previo | 18/165 (10,9) |
| Motivo ingreso rel. con VIH | 21/165 (12,7) |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Ingreso UCI | 14/165 (8,5) |
| Incumplimiento tratamiento al año | 18/155 (11,6) |
| Pérdida seguimiento al año | 18/147 (12,2) |
| Reingresos al año | 59/162 (36,4) |
| Fallecimiento al año | 17/165 (10,3) |

Conclusiones: La mayoría de los pacientes con infección por VIH que ingresan en el hospital son hombres y originarios de España. Más del 75% tienen un buen control inmunoviroológico previo. A pesar de que la mayoría de los pacientes mantienen tras el ingreso un buen cumplimiento del tratamiento y el seguimiento, el porcentaje de pacientes que reingresan o fallecen en el año siguiente es alto (36 y 10% respectivamente).