



## 1094 - INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA INFECCIÓN POR *CLOSTRIDIODES DIFFICILE* EN PACIENTES HOSPITALIZADOS: ESTUDIO RETROSPECTIVO DE 2019 A 2023

**Blanca Beamonte Vela**, Nuria Broco Villahoz, Laura Cristina Toma, Miguel Ángel Amor García, Maitane Sobrino Alonso, Sara Sevo Spahiu, Sandra Nicás Jiménez y María Lourdes Orgaz Salgado

Hospital Infanta Cristina, Madrid, España.

### Resumen

**Objetivos:** La infección asociada a *Clostridioides difficile* (IACD) representa una creciente preocupación en entornos hospitalarios debido a su impacto en la morbilidad y la carga económica. Este estudio retrospectivo investiga la incidencia de la IACD en pacientes hospitalizados, así como posibles factores de riesgo y predictores asociados.


**Métodos:** Se realizó un análisis retrospectivo de datos de pacientes hospitalizados entre 2019 y 2023 en un hospital de grupo I. Se seleccionaron los pacientes con IACD confirmada microbiológicamente. De ellos se recopilaron datos demográficos, clínicos y de tratamiento antibiótico de los registros médicos electrónicos. Se realizaron análisis descriptivo y correlacionales con una significación estadística de 0,1. Se estudiaron los potenciales factores de riesgo asociados tanto a la recurrencia de la infección como a la mortalidad mediante el cálculo de los *odds ratio* con regresión logística. Se ha contado con la aprobación del Comité Ético de Investigación.

**Resultados:** Se identificaron 120 pacientes con IACD, con predominio femenino (62%) y una edad media de 74 años. Hasta el 78% de los pacientes presentaba desnutrición moderada o grave (de acuerdo con el índice CONUT). El 43% de los pacientes tenía antecedentes de neoplasia, predominantemente pulmonar (40%), ginecológica (21%) o abdominal (17%). El 31% de los pacientes presentaba enfermedad renal crónica y el 25% presentaba deterioro cognitivo. Otras comorbilidades fueron: tabaquismo, EPOC y cardiopatía isquémica. El 60% de los pacientes había recibido antibioterapia previa, destacando cefalosporinas (20%), quinolonas (10%), carbapenemes (8,3%) y amoxicilina-clavulánico (8,3%). Del total de pacientes, para el tratamiento de la IACD, 103 (86%) recibieron vancomicina y 17 (14%) recibieron fidaxomicina. Se registraron 12 recurrencias y 16 fallecimientos (6 durante el ingreso y 10 durante los 30 días posteriores al alta). La incidencia de infecciones observó una tendencia ascendente durante el periodo estudiado. La edad se asoció positivamente con la mortalidad (74 vs. 83 años,  $p = 0,035$ ), así como la presencia de deterioro cognitivo (20 vs. 53%,  $p = 0,007$ ). El índice de Barthel se relacionó negativamente con la mortalidad (60 vs. 35,  $p = 0,061$ ). La recurrencia de IACD se relacionó significativamente con un índice CONUT moderado/grave, antecedente de neoplasia, tratamiento inmunosupresor, consumo de inhibidores de la bomba de protones, enolismo activo, hepatopatía crónica y deterioro cognitivo. El estudio multivariante demostró que el antecedente de neoplasia (OR = 5,40,  $p = 0,02$ ) y tener deterioro

cognitivo (OR = 4,05, p = 0,07) eran factores de riesgo, no solo para la mortalidad, sino también para la recurrencia de la IACD.


<b>Tabla 1. Características generales de nuestra cohorte (respecto a la mortalidad)</b>				
<b>Variable</b>	<b>Total, N = 120</b>	<b>No, N = 101</b>	<b>Sí, N = 19</b>	<b>p</b>
<b>Edad (años)</b>	74 (60, 84)	74 (60, 84)	83 (72, 88)	<b>0,035</b>
<b>Sexo (mujeres)</b>	74 (62%)	59 (58%)	15 (79%)	<b>0,091</b>
<b>Score Conut</b>				0,15
Leve	25 (22%)	23 (24%)	2 (11%)	
Moderado	49 (42%)	37 (38%)	12 (63%)	
Grave	42 (36%)	37 (38%)	5 (26%)	
<b>Índice de Barthel</b>	60 (30, 98)	60 (35, 100)	35 (21, 65)	<b>0,061</b>
<b>Antecedente de neoplasia</b>	52 (43%)	42 (42%)	10 (53%)	0,37
<b>Tratamiento habitual con IBP</b>	81 (68%)	69 (68%)	12 (63%)	0,66
<b>Tratamiento inmunomodulador</b>	27 (23%)	22 (22%)	5 (26%)	0,77
<b>EPOC</b>	19 (16%)	15 (15%)	4 (21%)	0,50
<b>Tabaquismo activo</b>	19 (16%)	18 (18%)	1 (5,3%)	0,30
<b>Enolismo crónico</b>	13 (11%)	13 (13%)	0 (0%)	0,22
<b>Hepatopatía crónica</b>	15 (13%)	13 (13%)	2 (11%)	> 0,99
<b>Cardiopatía isquémica o ICC</b>	28 (23%)	20 (20%)	8 (42%)	<b>0,072</b>
<b>Deterioro cognitivo</b>	30 (25%)	20 (20%)	10 (53%)	<b>0,007</b>
<b>C.D. Toxigénico</b>	65 (56%)	61 (62%)	4 (22%)	<b>0,002</b>

<b>Tabla 2. Características generales de nuestra cohorte (respecto a la recurrencia)</b>				
<b>Variable</b>	<b>Total, N = 106</b>	<b>No, N = 94</b>	<b>Sí, N = 12</b>	<b>p</b>
<b>Edad (años)</b>	76 (62, 85)	76 (64, 86)	71 (59, 82)	0,30
<b>Sexo (mujeres)</b>	69 (65%)	64 (68%)	5 (42%)	0,11
<b>Score Conut</b>				<b>0,046</b>
Leve	25 (24%)	23 (25%)	2 (17%)	
Moderado	43 (41%)	41 (45%)	2 (17%)	
Grave	36 (35%)	28 (30%)	8 (67%)	
<b>Índice de Barthel</b>	55 (30, 95)	55 (30, 100)	58 (34, 84)	0,96
<b>Antecedente de neoplasia</b>	44 (42%)	33 (35%)	11 (92%)	<b>&lt; 0,001</b>
<b>Tratamiento habitual con IBP</b>	70 (66%)	58 (62%)	12 (100%)	<b>0,007</b>
<b>Tratamiento inmunomodulador</b>	20 (19%)	14 (15%)	6 (50%)	<b>0,011</b>
<b>EPOC</b>	19 (18%)	15 (16%)	4 (33%)	0,22
<b>Tabaquismo activo</b>	16 (15%)	12 (13%)	4 (33%)	<b>0,081</b>
<b>Enolismo crónico</b>	10 (9,4%)	6 (6,4%)	4 (33%)	<b>0,014</b>
<b>Hepatopatía crónica</b>	11 (10%)	5 (5,4%)	6 (50%)	<b>&lt; 0,001</b>
<b>Cardiopatía isquémica o ICC</b>	27 (25%)	26 (28%)	1 (8,3%)	0,29
<b>Deterioro cognitivo</b>	29 (27%)	29 (31%)	0 (0%)	<b>0,034</b>
<b>C.D. Toxigénico</b>	56 (54%)	48 (52%)	8 (73%)	0,20



## Mortalidad por Clostridioides difficile

Resultados de la regresión logística



*Conclusiones:* La IACD continúa siendo una amenaza significativa en entornos hospitalarios, con una tendencia ascendente en su incidencia. La identificación de factores de riesgo, como la desnutrición, antecedentes de neoplasia y deterioro cognitivo, es crucial para desarrollar estrategias de prevención y manejo más efectivas. Específicamente, los pacientes con estas características requieren una monitorización más estrecha y medidas preventivas personalizadas para reducir tanto la recurrencia de la infección como la mortalidad asociada.