

## Revista Clínica Española



https://www.revclinesp.es

# 2102 - ESTUDIO DE CALIDAD DE VIDA TRAS EPISODIO AGUDO DE ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA (ETV)

Jose Portillo Sánchez, Maria José Redondo Urda, Tamara Romero Pastilla, Maria Lourdes Porras Leal e **Isabel María Carmona Moyano** 

Medicina Interna, Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, España.

#### Resumen

Objetivos: Análisis psicosocial e impacto, en pacientes que han sufrido un ETV de reciente diagnóstico y en seguimiento, como evento estresor e influyente en la calidad de vida. La ETV condiciona aparición de clínica adaptativa al proceso, influido por el estado de ánimo, vivencia personal, mecanismos de afrontamiento y soporte social. La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) como innovación de evaluación, y su importancia en la ETV, tiene interés por su contribución, dado la limitación de estudios previos.

 $\it Métodos:$  Estudio no experimental, descriptivo, prospectivo, longitudinal en pacientes con diagnóstico de TVP y/o TEP reciente, atendidos en la consulta monográfica de ETV del Servicio de Medicina Interna, aprobado por el CEIC del centro, y acepten participar en el estudio, cumplimentado el cuestionario y el consentimiento informado facilitados al alta de hospitalización o en revisión en la consulta. Se realizó búsqueda bibliográfica de la información sobre estudios previos. En el cuestionario se incluyeron variables basales demográficas y selección de instrumentos de evaluación (Cuestionario Salud SF-36V2, escala de estrés percibido, Cuestionario COPE-28, cuestionario de síntomas CL-90-R y Cuestionario MOS. Se presentó al CEIC evaluador con resolución positiva. El análisis estadístico se elaboró con paquete estadístico SPSS21, incorporando pruebas de estadística descriptiva, y  $\chi^2$ , Se estudia la posible relación entre las variables principales (CVRS, nivel de estrés, estrategias de afrontamiento, apoyo social percibido.

Resultados: La cohorte de pacientes fue de 67 pacientes, 53,7% hombres y 46,3% mujeres. con edad media de 57,78 años, entre 27 y 92 años. La mayoría jubilados 33,3%. Respecto al diagnóstico, se clasificó en episodio aislado de TEP 21 casos (31,3%), TEP + TVP 17 casos (25,4%) y TVP 28 casos (41,8%), sin entre sexos, edad ni nivel económico. Tampoco diferencias significativas por diagnóstico en salud percibida, estado de ánimo o actividad, constatando amplia percepción ayuda social. Destacan síntomas como falta de energía, flojedad, exceso preocupación, mareo, pesadez extremidades, insomnio, pensar en morir y dificultad concentración. El análisis por sexos observó tendencia en mayor percepción dolor y dificultad trabajo, con mayor percepción de estrés y tristeza, pero con más percepción de apoyo emocional en mujeres.

N.º pacientes,Sexo 67

DiagnósticoEstudios

Ingresos anuales en euros


Actividad laboral Hábitos Tóxicos referidos **Edad** 

Hombres<sub>TEP+TVP</sub>: Edad < 14.999:38 Empleado:17 Ausencia:44 media 36 Primarios: 27(40,3%) (65,7%)17 (25,4%) (56,7%)(25,4%)años 57,78 (53,7%) TEP (solo): Secundarios/Bachillerato:1515-24.999:15 DesempleadoTabaco:15 8 (11,92%) 21 (31,3%) (13,4%)(22,4%)(17,9&)Autónomo: 8 Alcohol: 15 Mujer 31TVP solo: 28 Superior/Universitario 22 Rango: 25-34.999: 7 25-92 (32,9%)(11,9%)(17,9%)(46,3%) (41,8%)(10,42%)Labores 35-44.999:5 Hogar: 7 Drogas: 1 (7,52%)(10,42%)45-59.999: 2 Jubilado/a:26 Moda 56 (3%)(38,8%)


Encuesta	Característica principal	Expresión del paciente	Objetivo	
SF-36V2		paciente tras el evento ETV, y	Obtener valoración general salud comparativa, así como implicación en actividades diarias	
Escala estrés 2.0	Estrés percibido	pensamientos y sentimientos	Detectar impacto estrés	
Versión española		en último mes, tras evento ETV		
Cuestionario COPE-28	Afrontar situaciones	sobreponerse a problemas	Detectar capacidad del paciente de sobreponerse al evento ETV	
Cuestionario Síntomas SCL-90- R	Síntomas	Expresión síntomas subjetivos generales	Valorar posible relación con evento ETV	
Cuestionario MOS	Apoyo social	Expresa el paciente su Constatar presencia ayud capacidad de recibir ayuda soporte ante el evento ET		

### Repercusión según diagnóstico


		DIAGNOSTICO				
			TEP+TVP	TEP SOLO	TVP SOLO	Total
SEXO	VARON	0	11	10	15	36
	MUJER	1	6	11	13	31
Total		1	17	21	28	67




Percepción Salud social: Se encuentra diferencia significativa ( p=0.040) para diagnóstico de TVP




Desaminado/deprimido último: No diferencias según diagnóstico P=0,523




Sensación de miedo a morir: No relación con diagnóstico ( p>0.9)




Sensación de salud actual : Se objetiva tendencia a una sensación de peor salud, en relación con el diagnóstico( p=0.092)en caso de TEP o TVP aislados.



Sensación de presentar reducción significativa en el trabajo o actividades cotidianas: No se encontró tampoco relación entre el diagnóstico.



En otras repercusiones según diagnóstico: no fue relevante el dolor en el pecho, no diferencias en apoyo emocional habitual, ni en salir de casa, ni culpabilidad ni problemas de dormir ni de ataques de pánico, manteniendo sin diferencias las ayudas en casa, entender situación ,ayudas a hablar y confiar, claramente a favor de su presencia total (p=0.001)



*Discusión:* Se obtuvieron múltiples variables que podrían modular el efecto estresor e impacto de la ETV en calidad de vida., Siendo extensísimo abordarlas todas, hemos incluido las relevantes, con objeto del estudio, para aproximación general, restando multitud de datos para análisis posterior.

Conclusiones: 1. La ETV puede tener impacto en la calidad de vida relacionada con el estado de salud, y el acompañamiento y apoyo psicológico podría ser valioso, dirigido a prevenir depresión y trastornos de pánico. 2. No parece haber diferencias estadísticamente significativas por el tipo de diagnóstico, en la percepción del estado de salud, de ánimo, ni en la actividad sociolaboral, en el grado intensivo. 3. Por sexos, se encontró diferencias significativas a favor de la mujer en cuanto mayor sensación de tristeza, repercusión en actividad social y nivel de estrés. pero con mejor percepción de ayuda y apoyo emocional ETV.

#### **Bibliografía**

1. Almagia EB. Apoyo social, estrés y salud. Psicología y salud, 2014;14(2):237-43.