



926 - COLANGITIS AGUDA: DESCRIPCIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Julia Fernández Navarro¹, Sara Argenta Fernández², María Castellote Atienza³, Pilar Sánchez Latasa¹, Alberto Álvarez Delgado⁴ y Moncef Belhassen García¹

¹Medicina Interna, Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Salamanca, España. ²Medicina Interna, Hospital Virgen del Puerto, Plasencia, España. ³Facultad de Medicina, Universidad de Salamanca, Salamanca, España. ⁴Aparato Digestivo, Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Salamanca, España.

Resumen

Objetivos: Describir características clínicas de los pacientes ingresados en planta de hospitalización con colangitis aguda incluyendo la mortalidad intrahospitalaria asociada al episodio.

Métodos: Se trata de un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo. Se realiza a partir de datos recogidos sobre 2064 episodios de colangitis aguda que cumplen los criterios de Tokio de 2018. Estos episodios corresponden a 1.571 pacientes y se encuadran en el período entre el 1 de enero del 2000 y 2 de octubre de 2023 en un mismo hospital. Este estudio ha sido aprobado por el comité de Ética de la Investigación del Hospital y se ajusta a la Declaración de Helsinki.

Resultados: Se analizaron 2.064 episodios de colangitis aguda correspondientes a 1.571 pacientes. La edad media fue de 76 años ($\pm 14,7$), con una mediana de 79 años y un rango intercuartílico entre 70 y 86 años. Las edades oscilaron entre los 0 y los 103 años. En cuanto al sexo, el 52,1% de los participantes fueron hombres ($n = 819$), el 47,2% mujeres ($n = 742$), y en un 0,6% ($n = 10$) no se dispuso de esta información. Respecto a la nacionalidad, el 88,7% de los pacientes ($n = 1.394$) eran de nacionalidad española, el 0,6% ($n = 10$) de otra nacionalidad, y en el 10,6% ($n = 167$) no se registraron datos al respecto. El número de episodios por año ha ido aumentando por lo general excepto en 2016, 2017, 2018 y 2019. En relación con el número de episodios por paciente, la media fue de 1 episodio ($\pm 0,9$), con un rango entre 1 y 16 episodios. La mayoría de los pacientes (82,2%) presentaron un único episodio. Los casos con múltiples episodios fueron menos frecuentes: el 11,8% tuvo 2 episodios, el 3,4% tuvo 3, y solo el 2,6% restante tuvo entre 4 y 16 episodios, destacando que únicamente una persona presentó 16 episodios. En cuanto a la mortalidad, se registraron 138 *exitus letalis* (6,7%) asociados a episodios de colangitis. 95 de ellos ocurrieron en el primer episodio y 25 en el segundo.

Conclusiones: La colangitis aguda es una enfermedad que afecta a ambos sexos por igual y la edad media es de 76 años por lo que afecta fundamentalmente a pacientes de edad avanzada. La mortalidad intrahospitalaria en nuestro medio es similar a otros centros (5%) aunque continúa siendo elevada. La mayoría de los fallecimientos durante el episodio ocurrieron en el primero. Respecto a la nacionalidad, en nuestro medio la mayoría de los pacientes han sido españoles. Las recurrencias, aunque son posibles, no afectan a la mayoría de los casos. La incidencia ha ido aumentando con los años. Posiblemente influya la mayor precisión diagnóstica como el aumento de supervivencia de la población.