



## EA-129 - EVALUAR EL RIESGO DE SANGRADO EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA E INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA MEDIANTE LA ESCALA CRUSADE

A. Rotura Piloto, J. Montoya Martínez y M. Ribera García

Medicina Interna. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

### Resumen

**Objetivos:** Nuestro objetivo fue evaluar la capacidad predictiva de la escala de riesgo CRUSADE en pacientes con ICC y ERC.

**Material y métodos:** Desde enero de 2015 hasta agosto de 2016, se incluyeron prospectivamente pacientes consecutivos con ICC. El sangrado intrahospitalario fue definido según los criterios CRUSADE y BARC. La ERC se definió como una tasa estimada de filtración glomerular de menos de 60 ml/min o presencia de daño renal (albuminuria/proteinuria) durante  $\geq 3$  meses. La capacidad predictiva de la escala CRUSADE fue establecida mediante el cálculo del área bajo la curva ROC.

**Resultados:** Se incluyeron 1.234 pacientes con un diagnóstico final establecido de ICC (edad  $68 \pm 13$  años), de los cuales 380 (31%) eran pacientes con ERC. El valor medio de la puntuación de riesgo CRUSADE fue de  $31 \pm 16$  puntos. Los pacientes con ERC tuvieron mayor puntuación CRUSADE ( $24 \pm 13$  vs  $45 \pm 12$ ,  $p < 0,001$ ) y una tendencia hacia una mayor tasa de hemorragia mayor (HM) intrahospitalaria (1,3% vs 2,4%,  $p = 0,16$ ). Un total de 26 (2,1%) pacientes tuvieron HM según criterios CRUSADE y 29 (2,4%) según la definición BARC. Independientemente de la definición de HM, la capacidad predictiva de la escala de riesgo CRUSADE en pacientes con ERC fue menor que en los pacientes sin ERC: (IC95% 0,54-0,64) 0,59 vs 0,71 (IC95%: 0,68 a 0,74),  $p = 0,035$  para sangrado CRUSADE y 0,58 (IC95% 0,53 hasta 0,64) vs 0,70 (IC95% 0,67-0,74),  $p = 0,028$  para el sangrado BARC.

**Discusión:** La enfermedad renal crónica (ERC) se ha asociado con un aumento significativo del riesgo de hemorragia en pacientes con ICC, la escala CRUSADE no ha sido validada específicamente en pacientes con enfermedad renal crónica.

**Conclusiones:** La escala de riesgo CRUSADE muestra un rendimiento inferior en la predicción del sangrado mayor intrahospitalario en los pacientes con ERC en comparación con aquellos sin ERC. Se necesitan más estudios para confirmar estos hallazgos y para explorar escalas de riesgo alternativas que predigan con mayor precisión el sangrado mayor intrahospitalario en pacientes con ERC.