



## EA-107 - PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES UNIDAD DE COORDINACIÓN ASISTENCIAL PRIMARIA INTERNA (U.C.A.P.I.)

N. Garrido Moriana<sup>1</sup>, R. Ferri Bataller<sup>1</sup>, M. Ruiz Ribó<sup>1</sup>, A. Gálvez López<sup>2</sup> y R. García Gómez<sup>3</sup>


<sup>1</sup>Medicina Interna, <sup>2</sup>Enfermería, <sup>3</sup>Asistente Social. Hospital General Virgen de la Luz. Cuenca.

### Resumen


**Objetivos:** El objetivo de este estudio es analizar cuáles son las patologías más frecuentes y la medicación más utilizada durante el periodo de los 4 primeros meses de la puesta en funcionamiento de la Unidad de Coordinación Asistencial Primaria Interna (U.C.A.P.I.).

**Material y métodos:** Es un estudio observacional transversal llevado a cabo en conjunto entre los servicios de Medicina Interna, Enfermería y Asistencia Social del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca (España). En él, se han recogido datos de 174 pacientes durante los 4 primeros meses de la puesta en funcionamiento de la Unidad de Coordinación Asistencial Primaria Interna (U.C.A.P.I.). Entre toda la información que se obtuvo encontramos cuáles han sido las patologías más frecuentes atendidas en esta unidad y la medicación más utilizada según éstas.


**Resultados:** Se han observado los siguientes resultados: la patología más frecuente ha sido la anemia (27% de los pacientes del registro), seguida de los procesos infecciosos (23%) y la insuficiencia cardíaca descompensada (20,1%). De 324 medicaciones usadas, la más repetida ha sido furosemida 20 mg (136 veces), seguida del Ferinject 500 mg ampolla (83 veces) y del FerIV 100 mg ampolla (33 veces) debido al carácter pluripatológico de estos pacientes.



**Figura 1.**



**Figura 2.**



**Figura 3.**

*Discusión:* Durante los 4 primeros meses de la unidad U.C.A.P.I. la patología más frecuente ha sido la anemia (27% de los pacientes de los 174 del registro), seguida de los procesos infecciosos (23%) y la insuficiencia cardíaca descompensada (20,1%). De 324 medicaciones usadas, la más repetida ha sido furosemida 20 mg (136 veces), seguida del Ferinject 500 mg ampolla (83 veces) y del FerIV 100 mg ampolla (33 veces) debido al carácter pluripatológico de estos pacientes y las principales patologías que éstos suelen padecer.

*Conclusiones:* La mayoría de pacientes que se benefician de la unidad U.C.A.P.I. en el Hospital General Virgen de la Luz (Cuenca) padecen algún tipo de anemia y requieren tratamiento o bien con diuréticos o con hierro.