



## I-259. - ¿OTRO CASO DE NEUMONÍA?

I. Leite, F. S. Ferreira, A. Martíns, M. Fonseca

*Clínica Universitária de Medicina II/Serviço de Medicina I. CHLN-Hospital de Santa María. Lisboa.*

### Resumen

**Objetivos:** La neumonía organizada con bronquiolitis obliterante es una entidad clínico-patológica distinta y de etiología diversa. Idiopática en la mayoría de los casos, puede ocurrir en el contexto de infección con afección pulmonar, conectivitis o iatrogenia.

**Métodos:** Mujer de 71 años, sin antecedentes relevantes y con epidemiología inocente. Admitida por sepsis con punto de partida urinario, asociado a litiasis renal complicada de hidronefrosis a la izquierda. A la admisión se presentaba eupneica, destacándose Murphy renal presente a la izquierda y auscultación pulmonar con estertores crepitantes en la base izquierda.

**Resultados:** La evaluación analítica reveló: Hb 11,4 g/dL, leucocitos 13.750 e 94,5% neutrófilos, PCR 11,7 mg/dl, VS 36, plaquetas 221.000, AST 22 U/L, ALT 25 U/L, LDH 342 U/L. Orina II: 500 leucocitos y 80 eritrocitos; nitritos negativos. Gasometría arterial (FiO<sub>2</sub> 0,21): pH 7,46 pCO<sub>2</sub> 31,2 pO<sub>2</sub> 59,2 HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> 23,9 SatO<sub>2</sub> 92,9% lactatos 8. En seguida se realizó TC- tórax: extensa densificación en vidrio despulido, bilateral, pero más expresiva a la derecha, donde se definen incluso áreas de consolidación afectando predominantemente al lobo inferior pero también al lobo medio y superior. Espesamiento de las paredes bronquiales y espesamiento de los septos interlobulares. Broncofibroscopia, lavado broncoalveolar, secreciones bronquiales y biopsia bronquial sin particularidades. Hemocultivos con aislamientos de *Proteus mirabilis*; urocultivo, Serologías virales y de neumonías atípicas negativas; ANCAS P e C negativos. ANA e anti DNA negativos.

**Discusión:** La evolución favorable bajo antibioterapia dirigida sin corticoterapia sistémica y los estudios complementares efectuados han permitido el diagnóstico final de neumonía organizada con bronquiolitis obliterante post infecciosa, un hallazgo raro y desafiante en el abordaje del enfermo.

**Conclusiones:** La remisión del cuadro clínico-radiológico tras la antibioterapia a la vez que la exclusión de otras etiologías, sugiere neumonía organizada con bronquiolitis obliterante en contexto de infección sistémica a *Proteus mirabilis* con involucramiento pulmonar. La bronquiolitis obliterante ha sido descrita con asociación a infecciones bacterianas, virales y fármacos. Ante un enfermo con insuficiencia respiratoria aguda, es importante la sospecha clínica de neumonía obliterante con realización de exámenes de imagen que permiten un rápido diagnóstico e intervención terapéutica dirigida.