



V-35. - PRECISIÓN DE LA ECOGRAFÍA CLÍNICA BÁSICA EN MANOS DEL INTERNISTA

L. Beltrán Romero¹, A. Sánchez Martín¹, A. Menéndez Saldaña¹, I. Narrillos¹, J. de la Cruz², J.R. Banegas², J. García Puig¹

¹Servicio de Medicina Interna. UMV. Hospital Universitario La Paz. IdiPAZ. Madrid. ²Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad Autónoma de Madrid/IdiPAZ-CIBERSP. Madrid.

Resumen

Objetivos: La ecografía en manos del internista permite responder preguntas clínicas concretas de forma rápida en el lugar de atención al paciente. En diversos estudios ha mostrado una buena precisión en el diagnóstico de diversas patologías cardíacas, abdominales y vasculares. En este estudio piloto hemos evaluado la precisión diagnóstica de la ecografía realizada por un médico internista para la evaluación de patologías del área cardiovascular y abdominal en condiciones de práctica clínica habitual.

Métodos: Estudio prospectivo realizado en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario La Paz. Los pacientes procedían de la consulta de la Unidad Metabólico Vascular o planta de Hospitalización de Medicina Interna. Previo consentimiento informado, se incluyeron de forma consecutiva a aquellos pacientes cuyo médico responsable consideraba necesario realizar una ecografía cardíaca, abdominal o vascular. De forma simultánea se solicitó la ecografía especializada por la vía habitual y la ecografía del internista. Se consideraron variables concretas y de relevancia clínica de ecocardiografía, ecografía abdominal y ecografía vascular, recogiénolas de forma dicotómica (normal/patológico). Se analizó la concordancia simple, sensibilidad y especificidad de la ecografía del internista en comparación con la ecografía especializada. Las ecografías del internista se realizaron con un aparato portable Esaote MyLab 25 por un médico internista con aproximadamente 300 horas de formación teórico-práctica (variable según modalidad de ecografía) y realización de 1-3 procedimientos al día en la práctica clínica habitual.

Resultados: Se analizaron 23 exploraciones ecográficas de abdomen, 22 ecocardiografías y 17 ecografías vasculares (12 ecografías de carótidas, 3 de aorta abdominal y 2 ecografías venosas de compresión). Los resultados de la precisión, sensibilidad y especificidad de la ecografía clínica básica para los principales parámetros de cada modalidad ecográfica se presentan en la tabla.

Validez de la ecografía realizada por el internista			
	Concordancia simple	Sensibilidad	Especificidad
Función sistólica VI	86,3%	100%	90,4%
Función diastólica VI	85,7%	100%	80%
Valvulopatía	77%	94%	42%
Colelitiasis	94%	83,3%	100%

Hepatopatía crónica	95,2%	100%	94,7%
Esteatosis hepática	90%	84,6%	100%
Estenosis carotídea > 50%	75%	100%	72,7%

Conclusiones: En nuestro estudio la precisión global de la ecografía cardíaca, abdominal y vascular realizada por un médico internista en condiciones de práctica clínica habitual fue buena. Aunque se trata de un estudio piloto, nuestros resultados sugieren que un médico internista con una formación media en ecografía multidisciplinar puede evaluar variables sencillas pero clínicamente relevantes para el manejo de patologías frecuentes del ámbito cardiovascular y abdominal.