



EP-063 - EDAD DE DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE PULMÓN EN CONSULTAS EXTERNAS DE NUESTRO HOSPITAL

R. Aranda Blázquez¹, C. Maza Ortega², J. Morales Morales², S. Romero Salado¹

¹Servicio de Medicina Interna. ²Servicio de Neumología. Hospital Universitario Puerto Real. Puerto Real (Cádiz).

Resumen

Objetivos: Se evalúan 76 casos de cáncer de pulmón basándonos en la edad del diagnóstico en un hospital universitario con el objetivo de valorar diferencias entre los distintos grupos de edad.

Métodos: Se estudian, de una forma retrospectiva, los pacientes remitidos a la consulta con sospecha clínica o radiológica de cáncer de pulmón en el año 2014. Revisamos estos casos para ver las diferencias según el grupo de edad.

Resultados: Se diagnosticaron 76 pacientes, 70 varones y 6 mujeres, La edad media es de 68,7 años \pm 9,53. Los rangos de edad son: menores de 45 años: 5 (6,57%), 45-55 años: 7 (9,2%), 55-65 años: 21 pacientes (27,6%), 65-75 años: 26 (34,2%) y mayores de 75 años 17 (22,3%) Entre los grupos de mayor edad, era más frecuente ser exfumador (64% de exfumadores entre los mayores de 65 años), siendo los más jóvenes los que continúan con un hábito tabáquico activo en el momento del diagnóstico. En los grupos de mayor edad (> 65 años) hubo más presencia de comorbilidades, siendo las más frecuentes encontradas: enfermedad respiratoria crónica 72 (94,7%), cardiopatía 31 (40,7%), enfermedad cerebrovascular 3 (3,94%), demencia 1 (1,31%), ulcus 1 (1,31%) y hepatopatía (2,63%).

Discusión: El cáncer de pulmón en nuestro medio se diagnostica de media a una edad mayor a 65 años, lo cual tiene una implicación pronóstica y en cuanto al tratamiento. De los pacientes mayores de 75 años, el 26% no pudo recibir ningún tratamiento debido a sus comorbilidades.

Conclusiones: En edades más avanzadas de la vida existen más comorbilidades que limitan las opciones terapéuticas en el momento del diagnóstico. Es necesario registrar y tratar dichas comorbilidades para dar una atención integral al paciente.