



IF-003 - ESTUDIO UNICÉNTRICO DESCRIPTIVO DE SARCOIDOSIS 1976-2015

N. Villalba, M. Rubio, M. Labori, X. Corbella, J. Mañá

Medicina Interna. Hospital Universitari de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Resumen

Objetivos: Estudio observacional de una cohorte de pacientes con sarcoidosis.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de 640 pacientes diagnosticados en un periodo de 40 años en el Hospital de Bellvitge.

Variable	Variable	Valor absoluto (porcentaje)
Sexo	Mujer	438 (68,4%)
	Varón	202 (31,6%)
Forma de presentación	EN/IPT	263 (41,1%)
	Tos/disnea	101 (15,8%)
	Lesiones cutáneas específicas	60 (9,4%)
	Asintomático	54 (8,4%)
	Artralgias/itis	36 (5,6%)

Variable	Variable	Valor absoluto (porcentaje)
Estadio radiológico al diagnóstico	0	56 (8,8%)
	1	387 (60,5%)
	2	143 (22,3%)
	3	42 (6,5%)
	4	12 (1,9%)

Variable	Variable	Valor absoluto (porcentaje)
Manifestaciones extratorácicas	Eritema nudoso/IPT	296 (46,2%)
	Artralgias/artritis	239 (37,3%)
	Fiebre/febrícula	151 (23,6%)
	Piel	133 (23,8%)
	Adenopatías periféricas	114 (17,8%)

Conclusiones: Predominancia en mujeres no fumadoras en la edad media de la vida. La forma de presentación más frecuente fue eritema nudoso e inflamación periarticular de tobillos, seguido de síntomas respiratorios. El síndrome de Löfgren constituyó el 46,2% de los casos. El 83% de los pacientes presentaron estadio radiológico I/II al diagnóstico. La ECA estaba elevada en el 51% de los casos. La variedad de afectaciones extratorácicas refuerza el concepto de que la sarcoidosis es una enfermedad sistémica.