



## V-178 - CUESTIONARIO SOBRE EL PACTO DE SILENCIO (PS) EN LA POBLACIÓN GENERAL

R. Castilla Ortiz<sup>1</sup>, G. Ruiz Villena<sup>1</sup>, R. Tinoco Gardón<sup>1</sup>, A. Rodríguez Borrell<sup>1</sup>, D. Ramírez Yesa<sup>1</sup>, M. Fernández Ávila<sup>1</sup>, A. González Quiñones<sup>2</sup>, F. Gómez Rodríguez<sup>1</sup>

<sup>1</sup>UGC Medicina Interna. Hospital Universitario de Puerto Real. Puerto Real (Cádiz). <sup>2</sup>UGC Doctor Federico Rubio. Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda. Cádiz.

### Resumen

**Objetivos:** Analizar el grado de información acerca de una enfermedad terminal que la población estaría dispuesta a transmitir a su familiar enfermo.

**Material y métodos:** Estudio descriptivo transversal cuya unidad de análisis son las respuestas obtenidas a una pregunta perteneciente a una encuesta creada por el equipo de trabajo, realizada aleatoriamente a familiares y pacientes de nuestro hospital. La pregunta fue "en caso de que un familiar padeciese una enfermedad terminal, ¿usted estaría de acuerdo en que fuese informado mucho (M), regular (R), poco (P) o nada (N)?".

**Resultados:** Se entrevistaron a un total de 107 personas, 62,6% mujeres, con una edad media de 51,2 años. Un 56,1% prefería comunicar M la situación a un familiar, habiendo estado en contacto previamente con ESCP el 16,7%. Un 28% respondió R a la hora de comunicar la situación, de ellos sólo el 16,7% refirió haber tenido contacto previo. En tercer lugar el grupo que respondió N, con un 10,3%, había estado tenido contacto previo un 18,2%. Aquellos que informaría P representaban un 5,6%, ninguno de ellos había mantenido un contacto previo con el ESCP.

**Discusión:** El PS es el acuerdo implícito o explícito por parte de familiares y/o profesionales para alterar la información que se le da al paciente en cuanto a su diagnóstico y/o pronóstico.

**Conclusiones:** Algo más de la mitad de la población adulta entrevistada está de acuerdo con informar M a su familiar sobre el mal pronóstico de una enfermedad. Llama la atención que aquellas personas que habían tenido contacto previo con los cuidados paliativos no estuvieran más predispuestos a romper el pacto de silencio.