



V-026 - ¿EL USO DE ANTIBIÓTICOS INFLUYE EN EL INGRESO POR SEPSIS? ESTUDIO DESCRIPTIVO

R. Castilla Ortiz¹, G. Ruiz Villena¹, V. Manzano Román², J. Piñero Charlo¹, M. Guzmán García³, M. Escobar Llompart¹, S. Romero Salado¹, F. Gómez Rodríguez¹

¹Medicina Interna. Hospital Universitario de Puerto Real. Puerto Real (Cádiz). ²Medicina Interna. Hospital San Rafael. Cádiz. ³Medicina Interna. Hospital Comarcal San Juan de la Cruz. Úbeda (Jaén).

Resumen

Objetivos: Dada la importante prevalencia en los Servicios de Medicina Interna y la necesidad del diagnóstico y tratamiento precoces hacen que sea fundamental realizar un estudio epidemiológico con el objetivo de optimizar el rendimiento clínico/terapéutico.

Material y métodos: Estudio retrospectivo donde se han seleccionado las altas en las que se reflejaba el diagnóstico de sepsis del Servicio de Medicina Interna de enero del 2015 a abril del 2016. Se realizó un análisis del sexo, edad, tratamiento antibiótico los 3 meses previos al ingreso hospitalario, la toma de muestras microbiológicas, el microorganismo aislado y la evolución clínica.

Resultados: En el período de tiempo analizado se identificaron 266 casos con sepsis. La edad media de los pacientes fue de 74,3 años, 138 hombres y 128 mujeres. Según el foco, se clasificaron en sepsis urinaria (SU) 51,9%, sepsis respiratoria (SR) 30,8%, Sepsis de tejidos blandos (ST) 8,6%, sepsis abdominal (SA) 7,5%, otras 1,2%. El número de cultivos monomicrobianos fue de 62,4%. El germen principal fue *E. coli* 35,9%, seguido de *P. aeruginosa* 14,2%, *Klebsiella* 9,4%, *S. aureus* 6,6%, *Candida albicans* 5,7%, *E. cloacae*, *E. faecalis* 3,8% respectivamente, *Morganella*, *Bacteroides* 2,8% respectivamente y otros 15%. Hubo un 12,8% de multirresistencias. Al 51,9% de los pacientes se les prescribió antibioterapia en los 3 meses previos a su ingreso: 45,4% betalactámicos, 25,7% quinolonas, 5,5% macrólidos 12,6% fosfomicina, 10,7% otros. Fallecieron el 10,2% de los ingresos hospitalarios.

Discusión: Nuestra cohorte tiene una edad elevada con una media de 74,3 años con una prevalencia de varones. El foco principal de la sepsis fue el urinario seguido del respiratorio. El microorganismo más prevalente fue *E. coli* seguido de *P. aeruginosa* y *Klebsiella*. Más de la mitad de los pacientes recibió antibioterapia en los 3 meses previos a su ingreso con betalactámicos.

Conclusiones: Nuestros pacientes presentaron una edad media mayor de la esperada, predominando la sepsis urinaria por *E. coli*. El hecho de que más de la mitad de los pacientes haya recibido antibioterapia previa a su ingreso nos hace plantearnos sobre la posible prescripción ambulatoria inadecuada de antibióticos.