Rev Clin Esp. 2016;216(Espec Congr):63

Revista Clínica Española

https://www.revclinesp.es

# V-138 - ESTUDIO DESCRIPTIVO SEGÚN LA EDAD, SEXO Y FRACCIÓN DE EYECCIÓN DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA (IC) DE NOVO EN PACIENTES (PC) QUE DESARROLLAN DIABETES MELLITUS TIPO 2 (DM2) EN SU EVOLUCIÓN EN UN HOSPITAL DEL SSPA

*M. Escobar Llompart, S. Romero Salado, L. Fernández Ávila, R. Tinoco Gardón, A. Rodríguez Borrell, N. Maya Ahmed, R. Castilla Ortiz, F. Gómez Rodríguez*

*Medicina Interna. Hospital Universitario de Puerto Real. Puerto Real (Cádiz).*

## Resumen

*Objetivos:*Conocer el perfil clínico en cuanto a las variables de edad, sexo y tipo de IC (en función de la fracción de eyección) en pacientes con IC de novo y desarrollo de DM2 en su evolución.

*Material y métodos:*Se seleccionó de una cohorte de 6.561 pacientes con IC aquellos pacientes que en su evolución desarrollaron DM2 (1.519 pacientes). Variables a estudio: edad media de presentación, sexo, tipo de IC. El tipo de IC queda definido en base a la fracción de eyección, siendo > 50% catalogada como IC con función sistólica conservada (IC-FSC) y en caso de 50% catalogada como IC con función sistólica deprimida (IC-FSD).

*Resultados:*Del total pacientes incluidos (1.519), la edad media global de presentación fue de 71,4 años (mujeres 72,6/hombres 69,3), el 54% fueron mujeres. El tipo de IC fue: 51,5% presentaron IC-FSC frente al 48,5% con IC-FSD.

*Discusión:*En nuestro estudio objetivamos que la edad media de presentación de IC está en torno a los 70 años, presentándose casi 3 años antes que en mujeres. Fue más frecuente su presentación en mujeres (54,2%). El tipo de IC más prevalente fue la IC-FSC (51,5%) frente a IC-FSD (48,5%).

*Conclusiones:*La IC de novo que en su evolución desarrolla DM2, fue más frecuente en pacientes con edad (sobre los 70 años), de sexo femenino y de predominio con función sistólica conservada.

0014-2565 / © 2016, Elsevier España S.L.U. y Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). Todos los derechos reservados.