



D-051 - INSULINA DEGLUDEC (IDEG) DISMINUYE EL RIESGO DE HIPOGLUCEMIA, A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES DEFINICIONES DE HIPOGLUCEMIA UTILIZADAS, EN COMPARACIÓN CON INSULINA GLARGINA U100 (IGLAR) EN LOS ESTUDIOS SWITCH-1 Y 2

E. Lecumberri¹, M. Galán², C. Wysham³, J. Gumprecht⁴, W. Lane⁵, L. Troelsen⁶, D. Tutkunkardas⁷ y S. Heller⁸


¹Diabetes. Fundación Jiménez Díaz-Ute. Madrid. ²Diabetes. Novo Nordisk Pharma SA. Madrid. ³Diabetes. Rockwood Clinic. Endocrinology Diabetes. Spokane, WA. EEUU. ⁴Diabetes. Medical University of Silesia. Department of Internal Diseases Diabetology and Nephrology. Katowice. Polonia. ⁵Diabetes. Mountain Diabetes and Endocrine Center. Asheville, NC. EEUU. ⁶Diabetes. Novo Nordisk A/S. Medical. Søborg. Dinamarca. ⁷Diabetes. Novo Nordisk (A/S). Global Medical Affairs. Novo Nordisk A/S. Søborg. Dinamarca. ⁸Diabetes. University of Sheffield. Academic Unit of Diabetes, Endocrinology and Metabolism. Sheffield. Reino Unido.

Resumen

Material y métodos: Dos estudios de 64 semanas, doble ciego, con tratamiento cruzado, compararon el riesgo de hipoglucemia, a través de diferentes definiciones, con IDeg una vez al día vs IGLar una vez al día en sujetos con diabetes mellitus tipo 1 (SWITCH-1) y tipo 2 (SWITCH-2). No se encontraron diferencias en HbA1C en los dos grupos de tratamiento en ambos estudios.

Resultados: En el estudio SWITCH-1 se objetivó una reducción significativa de las hipoglucemias en el periodo de mantenimiento a través de las diferentes definiciones de hipoglucemia utilizadas con IDeg vs IGLar (fig. 1). En el estudio SWITCH-2 también se observó una disminución significativa de las hipoglucemias con IDeg en el periodo de mantenimiento, a través de las diferentes definiciones de hipoglucemias utilizadas, a excepción de los episodios de hipoglucemia grave (en probable relación a la escasez de casos reportados), aunque la relación de tasas era comparable con las otras definiciones (fig. 2). Se observaron reducciones similares durante el periodo completo de tratamiento.

Figura 2. Ratios de hipoglucemias según las diferentes definiciones:




BG, glucosa en sangre; IC, intervalo de confianza; IDeg, insulina degludec; IGLar U100, insulina glargina U100; Nocturna, hipoglucemia grave o confirmada por BG durante la noche; NS, no significativo; Total, hipoglucemia grave o confirmada por BG; Grave, un episodio que requiere asistencia de terceros y adjudicación externa.

NCT02030600

Figura 1

Figura 1. Ratios de hipoglucemias según diferentes definiciones: SWITCH 1



BG, glucosa en sangre; IC, intervalo confianza; IDeg, insulina degludec; IGlir U100, insulina glargina U100; Nocturna, hipoglucemia grave o confirmada por BG durante la noche; NS, no significativo; Total, hipoglucemia grave o confirmada por BG; Grave, un episodio que requiere asistencia por terceros o adjudicación externa.
NCT02034513

Figura 2

Conclusiones: En general, la reducción de la tasa de hipoglucemia fue consistente a través de las diferentes definiciones de hipoglucemia utilizadas, especialmente en el periodo nocturno.