



DP-005 - CUIDADOS PALIATIVOS Y HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA: PERFIL DE PACIENTES Y CARACTERÍSTICAS ASISTENCIALES

R. García-Serrano¹, C. Jiménez Juan¹, D. Blanco Alba², J. Ternero Vega¹, J. Lanseros Tenllado¹, P. Díaz Jiménez¹, L. Moreno Gaviño¹ y M. Nieto Martín¹

¹Medicina Interna. Complejo Hospitalario Virgen del Rocío. Sevilla. ²Facultad de Medicina. Universidad de Sevilla. Sevilla.

Resumen

Objetivos: Analizar las características asistenciales y el perfil de una muestra de pacientes que ingresan en la Unidad de Cuidados Paliativos (UCP) y Hospitalización Domiciliaria (HD) del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Material y métodos: Estudio retrospectivo observacional de los registros de las historias clínicas de todos los ingresos efectuados en la Planta de Hospitalización de CP y en HD del Hospital Universitario Virgen del Rocío durante tres semanas, del 15 de febrero al 8 de marzo del 2017. Se estudiaron variables de filiación, clínicas, asistenciales, funcionales, pronósticas y socio-familiares.

Resultados: Se presentan en la figura.

VARIABLES DE FILIACIÓN			PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES				
Pacientes incluidos	95		Datos globales	Otro servicio hosp	48.4% (46)		
Edad media	71.77 [25-95]			Atención primaria	16.8% (16)		
Sexo	Mujeres	45% (45)		Urgencias	25.3% (24)		
	Hombres	52.6% (50)	De HD a UCP	9.5% (9)			
Lugar de ingreso	UCP	37.9% (36)	Origen más frecuente por unidad	UCP	63.9% (23) Urgencias		
	HD	62.1% (59)		HD	69.5% (41) Otro servicio		
PERFIL DE PACIENTES			SOPORTE FAMILIAR				
Oncológicos Vs no oncológicos			Cuidador principal	Sí	88.4% (84)		
	Oncológico	No onco		No	6.3% (6)		
Datos globales	60% (57)	40% (38)		Desconocido	5.3% (5)		
UCP	66.7% (24)	33.3% (12)	Parentesco del cuidador principal	Pareja	40.43%		
HD	55.9% (33)	44.1% (26)		Hijos-hermanos	39.35%		
Patologías más frecuentes				Contratado	5.32%		
Insuficiencia cardíaca			8.4% (8)	No valorable	14.89%		
Cáncer de pulmón			7.4% (7)	Índice de esfuerzo del cuidador	No recogido	100%	
Cáncer de colon			4.2% (4)		Claudicación familiar	No presente	68.4% (65)
Identificación de los pacientes			Nº ingresos en los 6 meses previos			Presente	16.8% (16)
Pacientes paliativos				29.5% (28)		No valorable	13.7% (13)
Pacientes pluripatológicos				11.6% (11)	CONSUMO DE RECURSOS		
Existencia o no de VVA			4.2% (4)	Nº de consultas en Urgencias en los 6 meses previos	Datos globales	1.4 [0-7]	
Nivel de complejidad			0%		UCP	1.6+/-1.2	
Capacidad funcional			Nº de consultas en Urgencias en los 6 meses previos		HD	1.2+/-1.2	
Índice de Barthel				43.4 +/- 34	Duración del ingreso	Datos globales	2.3 [0-9]
Escala funcional paliativa				45 +/- 23		UCP	2.6+/-2
Pronóstico			I.Profund	HD		2+/-1.8	
Datos globales				10,11+/-5	UCP	5.45	
UCP				12,2+/-5,2	HD	15.6	
HD			8,8+/-4,5	I.Paliar	6,3+/-3,8		

Conclusiones: Los Cuidados Paliativos y la Hospitalización Domiciliaria están adquiriendo una importancia fundamental en el sistema sanitario y en la sociedad en su conjunto debido a diversos factores, cómo el envejecimiento de la población y el aumento exponencial de los enfermos crónicos pluripatológicos o con enfermedades avanzadas, lo que hace que un 40% de los pacientes incluidos en nuestro estudio sean no oncológicos. El perfil de pacientes que ingresaron en estas unidades se caracterizan por ser de edad avanzada, con una dependencia elevada, alta mortalidad a corto plazo y disponer de un cuidador principal, fundamentalmente familiares de primer grado (conyugue y/o hijos). No existe una aplicación sistemática del Proceso Asistencial Integrado de Cuidados Paliativos existente en Andalucía, no estando generalmente recogida en la historia clínica la situación de terminalidad, escalas de valoración funcional y pronósticas, el nivel de complejidad o la existencia o no de registro de voluntades vitales anticipadas. Los pacientes que ingresaron en ambas unidades habían acudido a urgencias y/o estado ingresados como mínimo una vez en los 6 meses previos al estudio, conociéndose ya la existencia de una enfermedad avanzada. Además el 63,9% de los pacientes que ingresaron en Cuidados Paliativos procedían de Urgencias. Estos datos pueden poner de manifiesto la necesidad de planificar los cuidados, así como de mejorar la coordinación y la continuidad asistencial entre Atención Primaria y hospitalaria, con el objetivo de mejorar la atención minimizando el malestar emocional de pacientes y sus cuidadores.