



<https://www.revclinesp.es>

EV-028 - ¿ES IMPORTANTE VALORAR LOS NIVELES DE TROPONINAS EN EL ICTUS? EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL SISTEMA PÚBLICO ANDALUZ

E. Sánchez Relinque¹, V. Delgado Gil², J. Puerto Alonso¹, J. Gil Gascon³ y J. Bianchi Llave³

¹UGC Medicina Interna; ²UGC Neurología. Hospital de la Línea de la Concepción. La Línea de la Concepción (Cádiz). ³UGC Medicina Interna. Hospital Punta de Europa. Algeciras (Cádiz).

Resumen

Objetivos: Es conocida la correlación entre la elevación de troponinas y el ictus agudo. Queremos saber si dicha elevación guarda alguna relación con la mortalidad y/o la comorbilidad de los pacientes que han sufrido un ictus.

Material y métodos: Estudiamos de forma prospectiva 118 pacientes que ingresan de forma consecutiva en nuestra Unidad de Ictus durante 3 meses por cualquier tipo de patología cerebrovascular. Analizamos en todos ellos los factores socio- demográficos y en relación con el tipo de ACV, y lo correlacionamos con la mortalidad a corto plazo y la morbilidad (valorada mediante el RANKIN modificado).

Resultados: El 27,11% de los pacientes presenta elevación de las troponinas, en este grupo, se objetivó un aumento de la mortalidad. La OR de la mortalidad es 4,9 en pacientes con elevación de troponinas en comparación a los que no elevan troponinas, de forma independiente a la presencia de cardiopatía previa. El 42,5% de los pacientes que presentan un aumento de troponinas presenta RANKIN superior a 4 al alta, frente a un 21,2% del resto de pacientes.

Discusión: La elevación de troponinas en pacientes con ACV previo ensombrece el pronóstico de estos pacientes aumentando tanto la mortalidad como la morbilidad, requiriendo por ello un mayor control y vigilancia en la base aguda, con especial valoración de patología cardíacas subyacentes lo que, por si mismas, empeoran el pronóstico.