Rev Clin Esp. 2017;217(Espec Congr):443

Revista Clínica Española

https://www.revclinesp.es

I-218 - CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS DE UN BROTE DE HEPATITIS AGUDA POR VIRUS DE LA HEPATITIS A (VHA)

J. Martín Guerra[1], M. Martín Asenjo[1], L. Rodríguez Fernández[1], S. Lorenzo Pelayo[2], I. Usategui Martín[1], C. Hinojosa Mena-Bernal[1], B. Monteagudo Nogueira[1] y C. Dueñas Gutiérrez[1]

[1]Medicina Interna; [2]Aparato Digestivo. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid (Valladolid).

Resumen

Objetivos: Analizar las características epidemiológicas, clínicas y biológicas de los pacientes ingresados en nuestro hospital tras un brote de hepatitis por VHA, así como la asociación con otra infección aguda al diagnóstico.

Material y métodos: Estudio observacional, retrospectivo y transversal de los pacientes diagnosticados de hepatitis aguda por VHA durante un brote ocurrido desde abril hasta junio de 2017. Se estudian características demográficas, vía de contagio, alteraciones de enzimas hepáticas, bilirrubina, así como el índice de protrombina (IP). Del mismo modo, se analizan todas aquellas infecciones que pudieran haber sido adquiridas mediante las mismas vías transmisión que el VHA.

Resultados: Se diagnosticaron 9 pacientes hepatitis por VHA, de los cuales el 100% fueron varones, con una edad media 35 ± 11 años. El 44%(4) reconocieron relaciones sexuales de riesgo sin protección, el 56% restante no presentaba otro claro antecedente epidemiológico. En cuanto a la forma de presentación, el 56% (5) consultó por fiebre y malestar general, seguido de dolor abdominal (33%) y solo uno por odinofagia. Todos los pacientes presentaron citolísis hepática e hiperbilirrubinemia, con normalización de las enzimas hepáticas tras 3 semanas del diagnóstico. La alteración en función hepática se evidenció en la totalidad de los pacientes con IP medio 68 ± 12%. La ecografía, evidenció hepatomegalia en el 33%.

Discusión: El VHA es un virus hepatotropo, cuyo pico de incidencia aparece en la infancia. Existen series que describen brotes en grupos de hombres que practican sexo con hombres (HSH). En nuestro caso, 7 de los 9 pacientes son HSH, aunque solo 4 reconocen mantener relaciones sin protección. En uno de los casos, se diagnosticó de forma concomitante de infección por del VIH. Los 2 casos restantes, no presentaban factores de riesgo evidentes.

Conclusiones: El VHA es una causa conocida de hepatitis aguda, también, en la edad adulta, siendo un factor de riesgo ser HSH. La clínica es inespecífica. Es adecuado descartar otras infecciones de trasmisión sexual, sobre todo, en HSH.

0014-2565 / © 2017, Elsevier España S.L.U. y Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). Todos los derechos reservados.