



## G-047 - ACTIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA INTERNA EN ESPAÑA. ANÁLISIS DE SEIS MILLONES DE ALTAS HOSPITALARIAS (2006-2015)

J. Fernández Pardo, M. Meseguer Frutos, M. Millán Rodríguez, C. Royo-Villanova Reparaz, C. Aguirre González, I. Sanromán Monserrat, E. Muñoz Pérez y E. Sánchez Serrano

Medicina Interna. Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

### Resumen

**Objetivos:** Estudiar la actividad hospitalaria de los Servicios de Medicina Interna (SMI) del Sistema Nacional de Salud (SNS), a partir de las altas hospitalarias producidas durante el periodo 2006-2015.

**Material y métodos:** Estudio observacional retrospectivo a partir de los datos extraídos del conjunto mínimo básico de datos (CMBD) del Registro de Altas de los hospitales del SNS y de las aplicaciones de consulta del Portal Estadístico del SNS. Estudiamos las altas hospitalarias realizadas por los SMI durante los años 2006 a 2015 (último año con datos completos disponibles), analizando la distribución del número de altas, porcentaje por sexos y grupos de edad, estancia media, tasa de reingresos, complicaciones y mortalidad, nivel de severidad, peso y costo medios de los ingresos; así como la frecuencia de las Categorías Diagnósticas Mayores (CDM), los Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD), y categorías y secciones de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) más prevalentes en los SMI.

**Resultados:** Durante el periodo estudiado se produjeron en los hospitales del SNS un total de 36.818.674 de altas hospitalarias, de las cuales 6.212.886 (16,87% del total; 134,63 casos por 10.000 hab.) fueron realizadas por los SMI. De estas altas, el 84,5% lo fueron a domicilio, el 2,9% por traslado a otro hospital y un 1,9% por traslado a un centro sociosanitario. Un 52,1% de los pacientes eran varones. La edad media fue de 72,72 (desviación estándar [DE] 16,69) años, para los hombres de 71 (DE 16) años y para las mujeres de 75 (DE 17) años, y un 43,2% de los pacientes eran mayores de 79 años. La estancia media fue de 9,21 días (DE 10,70). Un 41,7% tenían un nivel de gravedad moderado, un 33,3% mayor y un 5,9% extremo; el riesgo de mortalidad era mayor o extremo en un 32% y la tasa de fallecimientos fue del 10,1%. El 93,2% de los pacientes ingresaron por urgencias. Los reingresos supusieron el 14,1%. La insuficiencia cardiaca (código 428 de la CIE) fue el diagnóstico principal más frecuente (6,7%), seguida de la neumonía (5,7%), la EPOC descompensada (3,8%) y otras enfermedades del ap. respiratorio (3,5%). Como CDM más frecuentes, las enfermedades y trastornos del sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema digestivo + sistema hepatobiliar y páncreas, sistema nervioso, y del riñón y vías urinarias fueron respectivamente el motivo del 30,1%, 21,8%, 13,2% ( $8,6 \pm 4,6\%$ ), 7,5% y 6,7% de las altas. Los GRDs más frecuentes fueron el 541 (10%), el 127 (6,1%), el 544 (5,3%) y el 87 (2,8%). La insuficiencia respiratoria (GRDs 541, 88 y 101) supone un 14,7% de las altas, y la insuficiencia

cardiaca (GRDs 127, 544 y 87) el 14,2% de todos los episodios. El peso español medio de los procesos fue de 0,91951 (DE 0,803465). El coste medio por ingreso en los SMI fue de 4.206,2 (DE 3.729,78) euros.

*Discusión:* El estudio de un registro como el CMBD del SNS sirve para hacer un retrato de la situación real de los hospitales, pero son conocidas sus limitaciones que dependen, sobre todo, de la calidad de los informes de alta. No obstante, el poder analizar la totalidad de la muestra, más de seis millones de altas, tiene una gran relevancia clínica y sociosanitaria, y sus resultados tienen un gran interés para la gestión y planificación sanitarias.

*Conclusiones:* En España, los internistas atienden a uno de cada seis pacientes hospitalizados. Cuatro de cada diez pacientes tienen 80 o más años y presentan un nivel de gravedad mayor o extremo. Nueve de cada diez pacientes ingresan en los SMI lo hacen de forma no programada, uno de cada diez fallece durante el ingreso y uno de cada siete reingresa antes de un mes. La insuficiencia cardiaca supone el diagnóstico principal más frecuente, aunque una de cada diez altas se encuadra en el GRD 541 que permanece como el más frecuente en los SMI durante todos los años del estudio. Las enfermedades y trastornos del sistema respiratorio y del sistema circulatorio (CDM 4 y 5) suponen la causa de más de la mitad de los ingresos en los SMI.