



<https://www.revclinesp.es>

IF-058 - ASOCIACIÓN ENTRE ACTIVIDAD FÍSICA Y ESTRÉS EMOCIONAL EN PACIENTES CON LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO

J. Vargas Hitos¹, A. Rosales Castillo¹, L. Sáez Urán¹, E. Alarcón Manoja², N. Navarrete Navarrete¹, J. Sabio Sánchez¹, D. Sánchez Cano³ y A. Soriano-Maldonado⁴

¹Medicina Interna. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada. ²Medicina Interna. Hospital Militar San Carlos. Cádiz. ³Medicina Interna. Hospital San Cecilio. Granada. ⁴Departamento de Educación. SPORT Research Group (CTS-1024). Departamento de Educación. Universidad de Almería. Almería.

Resumen

Objetivos: Valorar la posible asociación entre los niveles de actividad física (AF) y de estrés emocional percibido (EEP) en los pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES).

Material y métodos: Estudio transversal descriptivo en el que fueron incluidas 47 mujeres (edad media 41,3 años) con LES (? 4 criterios del American College of Rheumatology) con al menos un año de seguimiento en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves. La AF cotidiana y el sedentarismo fueron registrados mediante acelerómetro triaxial (ActiGraph software [Actilife versión 6.11.9]) que llevaron sujeto a la altura de la cadera mediante una banda elástica durante 7 días. Se presentan estadísticos descriptivos (media y desviación estándar). El estrés emocional fue valorado mediante la escala de EEP de Cohen. Se recogieron variables sociodemográficas y clínicas (tales como años de evolución del LES, presencia de factores de riesgo cardiovascular, índice SLEDAI o tratamientos recibidos). Se realizó un análisis de regresión lineal ajustada por potenciales confundidores.

Resultados: Tras ajustar por edad, adherencia a la dieta mediterránea y nivel de depresión, un mayor nivel de actividad física moderada a vigorosa (AFMV) se asoció con menor nivel de EEP ($b = -0,091$; IC95% $-0,177$ a $-0,005$; $p = 0,040$). Además, aquellas pacientes que cumplieron las recomendaciones internacionales de actividad física del American College of Sports Medicine mostraron una puntuación total de EEP 4,5 (IC95% 0,6 a 8,5; $p = 0,025$) unidades menor respecto a las mujeres que no cumplieron dichas recomendaciones.

Discusión: Los resultados del presente trabajo sugieren que mayores niveles de AF se asocian con menores niveles de estrés emocional en mujeres con LES. Estos hallazgos fueron independientes de importantes factores confundidores como son la adherencia a la dieta mediterránea o la depresión. Dado que un adecuado control del estrés emocional se asocia a una menor actividad del LES y a un menor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, el presente estudio pone de manifiesto la importancia potencial de la AF desde una perspectiva psicológica e invita a futuros estudios prospectivos para determinar la capacidad de la AF para predecir el nivel de estrés en esta población.

Conclusiones: Mayores niveles de AF se asocian con menores niveles de estrés emocional en mujeres con LES. Estos resultados podrían tener importantes implicaciones para el tratamiento del estrés emocional en pacientes con LES, aunque se necesitan futuros estudios experimentales para determinar si existe un mecanismo causal entre estas dos variables.