



EA-050 - ÍNDICE BARTHEL SIMPLIFICADO PARA EVALUAR INDEPENDENCIA FUNCIONAL Y DEPENDENCIA SEVERA EN PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS

J. Ternero Vega, M. Bernabéu Wittel, C. Jiménez Juan, J. Lanseros Tenllado, L. Nieto Martín, B. Barón Franco y M. Ollero Baturone

Medicina Interna. Complejo Hospitalario Virgen del Rocío. Sevilla.

Resumen

Objetivos: Evaluar si una versión abreviada del Índice Barthel (IB) de una o dos preguntas pudiera utilizarse como screening de independencia y de dependencia grave para las actividades básicas de la vida diaria en pacientes pluripatológicos (PPP).

Material y métodos: Estudio transversal utilizando los datos de la inclusión de una muestra multicéntrica de 37 hospitales españoles. Se recogieron datos demográficos, clínicos y funcionales mediante la administración del índice de Barthel (IB) en situación basal. La independencia funcional se definió como valores del IB \geq 90 puntos y la dependencia grave como valores.

Resultados: Se incluyeron 1.632 pacientes (edad media $77,9 \pm 9,8$, siendo el 53% varones). La media del índice Barthel basal fue 60 ± 31 . Respecto al análisis para predecir un IB \geq 90, “deambular” y “subir y bajar escalas” fueron las actividades con mayores VPP, 81 y 92%, respectivamente. La combinación de ambos ítems mantuvo la exactitud obtenida con las dimensiones utilizadas en solitario, aumentando el VPP al 95%. “Comer solo” fue la actividad con mayor VPN (99%). En cuanto al análisis para predecir un IB \geq 60, “deambular” y “subir y bajar escalas” fueron también las actividades con mayores VPP, 99,2% y 99,2%, respectivamente. La combinación de ambas actividades aumentó ligeramente el VPP a 99,6%, manteniendo la exactitud de las dimensiones utilizadas en solitario. El ítem “comer solo” tuvo un VPN del 86,8%.